

# Svensk sortklassificering av odlade växter

Nyttoväxterna och deras Grupper



Swedish cultivar classification of cultivated plants  
Crops, vegetables and fruits and their Groups

Björn Aldén och Svengunnar Ryman



Björn Aldén och Svengunnar Ryman

# **Svensk sortklassificering av odlade växter**

Nyttoväxterna och deras Grupper



© Författarna och SLU Tankesmedjan Movium  
[movium.slu.se](http://movium.slu.se)

Stad & Land nr 192



Stad & Land är en bokserie som ges ut av SLU Tankesmedjan Movium.  
SLU Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och vänder sig till  
dem som planerar, projekterar, anlägger, förvaltar och forskar om urbana landskap.

Omslagsfoto: Cucurbita pepo (Pajpumpa-Gruppen) 'Harvest Moon'. Foto: Björn Aldén

ISBN: 978-91-8046-809-1

ISBN: 978-91-8046-810-7 (pdf)

Redaktör: Fredrik Jergmo

Formgivning: Björn Sundberg

Tryckeri: E-print, 2023

## Inledning

I Stad och Land nr 191 publicerades den första delen av två som behandlar aktuell svensk Gruppindelning av kulturväxtsorter, med få undantag enligt Svensk Kulturväxtdatabas 2021. Som beskrevs i den delen, som behandlade våra prydnadsväxter, baseras klassificeringen främst på internationell odlartradition men också, när detta varit möjligt, på den internationella kulturväxtkodens Gruppbegrepp (International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, ICNCP, Brickell & al. 2016). Enligt denna kod är Gruppen en formell kategori där ordet Grupp eller Gruppen alltid skrivs med inledande versal.

För att vara internationellt etablerade måste Grupp-namn vara publicerade. Elektronisk publicering, såsom i SKUD, räcker således inte. Publikationen måste även uppfylla några andra krav. För Grupp-namn som bygger på vetenskapliga namn måste även en hänvisning till det använda (och nu omdömda) vetenskapliga namnet finnas. För övriga Grupp-namn måste finnas en beskrivning av Gruppen eller en hänvisning till en tidigare sådan. I och med att denna andra och sista del nu publiceras uppfylls kraven för etablering för samtliga Grupp-namn i SKUD. Turen har alltså kommit till de växter vi traditionellt kallar nyttoväxter.

Grupp-namnen följer samma mönster som för prydnadsväxterna, men avviker ändå i flera hänseenden. Till skillnad från prydnadsväxterna har nyttoväxterna haft och har direkt betydelse för människans överlevnad. I takt med att jorden utforskades introducerades mängder av nya nyttoväxter till västvärlden från andra kulturer. Behovet av namngivning och klassificering för vidare spridning blev tidigt stort. Till buds fanns redan vetenskaplig nomenklatur på latin. Som bekant utvecklas denna rejält under Carl von Linnés tid och blev snart internationellt anammat. Den vetenskapliga namngivningen var förvisso främst ämnad för att beskriva jordens vilda organismer, vartefter de påträffades. Men vetenskapliga namn kom att ges även till rena kulturprodukter, vilket var föga konstigt. Det var under lång tid omöjligt för botanister att bedöma vissa växters bakgrund. Egentligen är det först nu, under sent 1900-tal och under 2000-talet, vi med hjälp av molekylära metoder med rätt stor säkerhet kan bedöma växters evolutionära historia. Vi har börjat lära oss att flera av de tidigare introduktionerna inte var vilda växter utan redan förädlade produkter eller selektioner gjorda av människan. Det här innebär att det finns tusentals vetenskapliga eller pseudovetenskapliga namn på rena kulturprodukter, namn som i internationella förädlingsammanhang och i lagtexter m.m. ofta används än idag.

När SKUD utvecklades och nyttoväxtnamn började registreras togs naturligtvis hänsyn till det. Men det faktum att den internationella kulturväxtkoden infört och uppmuntrat användningen av den nya enheten (rangen) Grupp för människoskapade växter och dessutom möjliggjort att vetenskapliga form-, varietets-, underarts- och artnamn på sådana, när dessa befanns vara onaturliga, kunde användas som bas för Grupp-namnen, valde vi att göra så för ett antal Grupp-namn i SKUD.

Den stora fördelen med Grupp-namn som bygger på vetenskapliga namn är att de omedelbart är tillgängliga även internationellt, till skillnad från Grupp-namn som bygger på inhemska namn. Med detta sagt kan vi ändå konstatera att det finns slakten där den vetenskapliga namndjungeln är för snårig eller där vetenskapliga namn inte räcker till för att bygga vidare på dem. I sådana fall har vi använt svenska benämningar som bas för Grupp-namnet. I ett antal slakten där nya grupper av sorter når oss från andra världsdelar, eller där förädling frambringar nya sorttyper, förekommer Grupp-namn som baserats ömsom på vetenskapliga och ömsom på inhemska namn. Som påpekats ovan, för att Grupp-namn som bygger på vetenskapliga namn ska vara giltiga, krävs en hänvisning till det vetenskapliga namn som omdömts. En beskrivning av Gruppen krävs däremot inte. Men för att ge ytterligare information till de användare som vill veta litet mera om sorterna i en Grupp har vi nästan genomgående valt att även inkludera en kortare eller längre beskrivning här. Den kan gälla sorternas ursprung, användning eller morfologi.

## Introduction

This is a continuation of the publication *Svensk sortklassificering av odlade växter - prydnadsväxterna och deras Grupper* (Swedish cultivar classification of cultivated plants - ornamental plants and their Groups, Stad & Land Nr 191, 2022). This, the second and final part, is dealing with utility plant cultivars and their Groups in use or cultivated in Sweden. As revealed in the first part, the Swedish cultivar classification in Groups corresponds to the one present in the Swedish Utility and Cultivated Plants Database (SKUD) 2021 and is primarily founded on international grower and breeder tradition but at the same time is based on the Group concept of ICNCP – as far as this has been applicable. For other and more general considerations of the Group concept and its application according to us, we refer to the English introduction in Stad & Land Nr 191.

The Group-names in this publication follow the same pattern as the ones for ornamentals, but deviate in some aspects. Having at the same time a longer tradition of cultivation and evidently a much wider international use, compared to most ornamentals, utility plants have over the centuries, until recently primarily been classified using scientific names. This has often been done irrelevant of, or should we perhaps say, unknowingly of, their origin. This is by no means strange. In fact, only recently - from the late 20th century - we have started to gain knowledge enough to judge whether they are or have been naturally occurring wild taxa (forms, varieties etc.) or are partly or purely human products.

But, when the ICNCP introduced the collective entity called “Group”, to be used for plants of horticultural or agricultural value, SKUD soon embraced this facility, after considering it having a wider and often more accurate application compared to scientific names. Nevertheless, scientific and even pseudoscientific epithets (i.e. convars) are still of great value in horticulture, as constituents of Group names.

According to the ICNCP the Group is a tool for collecting cultivars with a similar origin, usage or morphology. This means Group names also can be based on this information. But as an abandoned and/or reclassified scientific name, for the most, corresponds to a specific circumscription and is international, the use of that will be a much quicker and more direct way of defining a Group and its cultivars.

The advantage of using scientific epithets in Group names, compared to the other type of Group names, is obvious. The name and what it represents will easily be recognized internationally, whereas names based on a national language will seldom not. If more widely accepted, they will also limit the number of Group names used internationally and thus, will be more efficient. Looking at the Group names of utility plants in SKUD, and in this publication in particular, scientific epithets in Group names dominate. But, still, there are genera where the scientific name jungle is too tangled or the names are considered less suited. For these genera Group names are based on descriptive terms in Swedish.

As claimed in the introduction to the ornamentals: Despite the fact that this article is in Swedish, the Group treatments should be easy to follow, especially when studying the references to each Group. For the more descriptive parts Google translate should do the job as far as needed. Common names in English for the current Swedish Groups are found in an index.

## Tack

Författarna vill rikta ett varmt tack till Splendor Plant AB, Sveriges Utsädesförening, Sveplant AB och POM/Nationella genbanken utan vars finansiella stöd denna skrift inte kunnat tryckas. Ett särskilt tack också till SLUs Tankesmedja Movium för synpunkter på korrektur och hjälp med teknisk redigering och layout. Upphovsrätten till samtliga färgbilder, som vänligen ställts till vårt förfogande utan kostnad, tillhör angivna källor.

## Aktuella Grupper

### **Actinidia Minikiwi-Gruppen**

minikiwi

Namn baserat på handelns benämning "minikiwi" (Truedsson 1999, Säll 2005). Sorter av selektioner av eller hybrider mellan de småfruktiga arterna *Actinidia arguta*, *kolomikta* och *melanandra* (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Issai'

### **Allium ampeloprasum Kurrat-Gruppen**

kurrat

Namn baserat på *Allium kurrat* K.Krause och motsvarar *A. porrum* Kurrat Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). En eller få icke namngivna sorter, vars blad används färska i sallader etc. (Aldén & al. 2009).

### **Allium ampeloprasum Porrum-Gruppen**

purjolök

Namn baserat på *Allium porrum* L. (Wiersema & León 2013) och motsvarar *A. ampeloprasum* Leek Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Sorter med cylinderformad lök. (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Haldor'



*Allium ampeloprasum* (Porrum-Gruppen)  
'Haldor'. Foto: Leif Lindblom

### **Allium ampeloprasum**

#### **Sectivum-Gruppen**

pärllok

Namn baserat på *Allium porrum* var. *sectivum* Lueder (Hanelt & al. 2001) och motsvarar *A. porrum* Pearl Onion Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn).

Representerar några få ännu icke namngivna sorter med täta knippen av relativt små, runda och solida (ej skiktade) lökar med vitt skal (Aldén & al. 2009).

### **Allium cepa Aggregatum-Gruppen**

schalottenlök

Namn baserat på *Allium cepa* var. *aggregatum* G.Don, ursprungligen givet för den s k potatislöken, och motsvarar *A. cepa* Aggregatum Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Gruppen inkluderar och domineras av schalottenlökar, vilka tidigare felaktigt samlades under *A. ascalonicum* L. Sorter som bildar knippen av flera till många, små till medelstora, än runda än avlånga lökar med ljust till mörkt rödbrunt skal. Smak mild eller skarp. Sätter sällan frö. De milda, slutligen nästan klotrunda sorterna, urskiljs ibland som potatislök (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Frändarve'



*Allium cepa* (Aggregatum-Gruppen)  
'Frändarve'. Foto: Svein Solberg, Nordgen

### **Allium cepa Gullök-Gruppen**

gul lök

Namn baserat på det svenska namnet gul lök, för sorter med relativt stor lök med gult eller brunt skal (Aldén & al. 2009). Motsvarar delvis *A. cepa* Common Onion Group (Wiersema & León 2013, som



alternativnamn).

**Sortexempel:** 'Ailsa Craig'

### **Allium cepa Rödlök-Gruppen** rödlök

Namn baserat på det svenska namnet rödlök, för sorter med relativt stor lök med rött eller purpurfärgat skal (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Red Baron'

### **Allium cepa Silverlök-Gruppen** silverlök

Namn baserat på det svenska namnet silverlök, för sorter med liten till stor lök, med vitt eller silvrigt skal. Används färsk eller som inlagd. Beroende på användning kan sorter alternativt placeras i Syltlök-Gruppen (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Silvermoon'

### **Allium cepa Syltlök-Gruppen** syltlök

Namn baserat på det svenska namnet syltlök för sorter med relativt liten lök, med vitt skal, som ofta används som inlagda (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'La Reine'

### **Allium sativum Ophioscorodon-Gruppen** ormlök

Namn baserat på *Allium sativum* var *ophioscorodon* (Link) Döll och motsvarar *A. sativum* Ophioscorodon Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Sorter vanligen med både lök och bulbiller. De senare i toppen på en ofta ormlikt slingrande stjälk. Morfologiska/fenologiska typer brukar benämnas Rocambole (rockenboll-typ), Porcelain (porslins-typ) och Purple Stripe (purpurstrim-typ). Sistnämnda ibland uppdelad på tre olika (Standard Purple Stripe, Glazed Purple Stripe och Marbled Purple Stripe). Dessutom finns grupperingar som Asiatic, Creole och Turban, alla med mer eller mindre väl utvecklad stängel, ofta ihopblandade med de tre första. På genetiska grunder har de tre sista dessutom av somliga klassificerats som "softnecks", dvs. som *A. sativum* var. *sativum* (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Russian Red'

### **Anethum graveolens Sowa-Gruppen** indisk dill

Namn baserat på *Anethum sowa* Fleming (t.ex. Wiersema & León 2013). Odlas framför allt i SÖ Asien och utmärks bl.a. av avvikande essentiella oljor. Innehåller t.ex. dillapiol som vanlig dill saknar. Blomställningsgrenarna är färre och frukterna är mindre plattade, men längre och med tydligare ribbor (Guzman & al. 1999). Namngivna sorter ännu ej påträffade i Sverige.

### **Apium graveolens Dulce-Gruppen** blekselleri

Namn baserat på *Apium graveolens* var. *dulce* (Mill.) Pers. och motsvarar *A. graveolens* Stalk Celery Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Sorter vars bleka eller mer sällan gröna bladskaft, med eller utan bladskiva, används som färskas eller kokta (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Tango'

### **Apium graveolens Rapaceum-Gruppen** rotselleri

Namn baserat på *Apium graveolens* var. *rapaceum* (Mill.) Gaudin och *A. graveolens* Rapaceum Group (Facciola 1998). Sorter vars uppsvällda rot används som grönsak och krydda (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Ilona'



*Apium graveolens* (Rapaceum-Gruppen)  
'Ilona'. Foto: Leif Lindblom



### **Apium graveolens Secalinum-Gruppen** bladselleri

Namn baserat på *Apium graveolens* var. *secalinum* Alef. och *A. graveolens* Secalinum Group (Facciola 1998). Sorter vars, ofta finflikiga, blad används som sallad m.m. (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Pikant'

### **Artemisia dracunculus Glaucia-Gruppen** rysk dragon

Namn baserat på *Artemisia glauca* Willd. (Guzman & Siemonsma 1999). Dekaploida, ofta fröförökade, mindre aromatiska sorter (Aldén & al. 2009). Namngivna sorter ännu ej påträffade i Sverige.

### **Artemisia dracunculus Sativa-Gruppen** fransk dragon

Namn baserat på *Artemisia dracunculus* 'Sativa' (Facciola 1998). Få namngivna tetraploida, vanligen kraftigt aromatiska, sterila och vegetativt förökade sorter (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Pfefferkorn'

### **Avena sativa Gulhavre-Gruppen** gulhavre

Namn baserat på det svenska namnet gulhavre (se t.ex. Hylander 1953) för sorter med gula kärnor, dvs. frön (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Matilda'

### **Avena sativa Svarthavre-Gruppen** svarthavre

Namn baserat på det svenska namnet svarthavre (se t.ex. Hylander 1953) för sorter med grå eller vanligen svarta kärnor, dvs. frön (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Same'

### **Avena sativa Vithavre-Gruppen** vithavre

Namn baserat på det svenska namnet vithavre (se t.ex. Hylander 1953) för sorter med vita kärnor, dvs. frön (Aldén & al. 2009). Sorter av vithavre klassificeras ibland antingen som vårhavre (Jordbruksverket 2020) eller hösthavre, dvs. i analogi med

korn, råg och vete där sorter beroende på sätiden kan rubriceras som höst- eller vårsorter. I SKUD prioriteras de historiskt viktiga och beskrivande Grupp-namnen, medan information om lämplig sätid är ett komplement.

**Sortexempel:** 'Aveny'

### **Beta vulgaris Foderbeta-Gruppen** foderbeta

Namn baserat på det svenska namnet foderbeta (se t.ex. Krok & Almquist 1883) och motsvarar Fodder Beet Group (Lange & al. 1999). Sorter vars uppsvällda del (betan) är rund, cylindrisk eller spolförmig, till hälften eller två tredjedelar ovanjordisk och består av både hypokotyl och rot. Har låg sockerhalt och används som foder (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Bangor'

### **Beta vulgaris Fodersockerbeta-Gruppen** fodersockerbeta

Namn baserat på det svenska namnet fodersockerbeta (se t.ex. Larsson-Kilian 1912, Dahlberg & Johansson 1941). Sorter vars uppsvällda del (betan) är kägelförmig, nästan helt underjordisk och utgörs i huvudsak av rotvävnad. Har ganska hög sockerhalt och används till foder (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Kyros'

### **Beta vulgaris Mangold-Gruppen** mangold

Namn baserat på det svenska namnet mangold (se t.ex. Lundén 1912, Jönsson & Simmons 1935), inkluderar *Beta vulgaris* Cicla Group och Flavescens Group (Barlow & Porcher 2005) och motsvarar *B. vulgaris* Leaf Beet Group (Lange & al. 1999). Sorter där blad eller bladskaft används som grönsak. Hypokotyl och/eller rot ej eller endast svagt förtjockad (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Silver'

### **Beta vulgaris Rödbeta-Gruppen** rödbeta

Namn baserat på det svenska namnet rödbeta (se t.ex. Linné 1731) och motsvarar *Beta vulgaris* L. Garden Beet Group (Lange & al. 1999) och *B. vulgaris* Conditiva Group (Barlow & Porcher 2005). Sorter



*Beta vulgaris* (Mangold-Gruppen) 'Silver'.  
Foto: Leif Lindblom  
med förtjockad hypokotyl (betan), som  
huvudsakligen används som rotfrukt. Betan  
oftast röd, men kan även vara rosa, gul (s.k.  
gulbeta), vit (s.k. vitbeta) eller rödrandig, (s.k.  
polkagrisbeta eller polkabeta) (Aldén & al.  
2009).  
**Sortexempel:** 'Formanova'



*Beta vulgaris* (Rödbeta-Gruppen) 'Formanova'  
Foto: Gitte K. Björn, Nordgen

### **Beta vulgaris Sockerbeta-Gruppen sockerbeta**

Namn baserat på det svenska namnet sockerbeta (se t.ex. Krok & Almquist 1883, Nathorst 1905) och motsvarar *Beta vulgaris* Sugar Beet Group (Lange & al. 1999). Sorter vars uppsvällda del (betan) är kägelformig, nästan helt underjordisk och utgörs i huvudsak av rotvävnad. Har hög sockerhalt och används till sockerproduktion (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Smash'

### **Brassica juncea Integrifolia-Gruppen bladsarepta**

Namn baserat på *Brassica juncea* subsp. *integrifolia* (H.West) Thell. (Hanelt & al. 2001) och inkluderar här *B. juncea* Cutleaf Mustard Group, Head Mustard Group, Large Petiole Mustard Group och Leaf Mustard Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Sorter med hela, ofta krusiga, sågade eller flikiga blad (ibland samlade i huvud), vilka används som inlagda, kokta eller färska (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Osaka Purple'



*Brassica juncea* (Integrifolia-Gruppen)  
'Osaka Purple'. Foto: Runåbergs Fröer

### **Brassica napus Annua-Gruppen vårraps**

Namn baserat på *Brassica napus* f. *annua* (Schübl. & G.Martens) Thell. och motsvarar *B. napus* Summer Oil Rape Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Sorter för oljeproduktion som sås på våren för skörd samma år (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Mirakel'



### **Brassica napus Biennis-Gruppen** höstraps

Namn baserat på *Brassica napus* f. *biennis* (Schübl. & G.Martens) Thell. och motsvarar *B. napus* Winter Oil Rape Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Sorter för oljeproduktion som sås på hösten för skörd året därpå. De unga plantorna övervintrar (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Mascara'

### **Brassica napus Foderraps-Gruppen** foderraps

Namn baserat på det svenska namnet foderraps (se t.ex. Statens Växsortsnämnd 1995). Sorter vars huvudsakliga användning är som djurfoder (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Delta'

### **Brassica napus Napobrassica-Gruppen** kålrot

Namn baserat på *Brassica oleracea* var. *napobrassica* L. (Aldén & al. 2009) och motsvarar *B. napus* Rutabaga Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn).

**Sortexempel:** 'Globus'

### **Brassica napus Pabularia-Gruppen** sibirisk bladrap

Namn baserat på *Brassica napus* var. *pabularia* (DC.) Rechb. (Aldén & al. 2009) och motsvarar *B. napus* Pabularia Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Sorter vars flikiga blad används färska som grönsak, kokta eller frästa.

**Sortexempel:** 'Red Russian'

### **Brassica oleracea Alba-Gruppen** vitkål

Namn baserat på *Brassica oleracea* var. *capitata* L. f. *alba* DC. (Aldén & al. 2009) och motsvarar *B. oleracea* White Cabbage Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn).

**Sortexempel:** 'Säfstaholm'



*Brassica oleracea* (Alba-Gruppen) 'Säfstaholm'  
Foto: Matti Leino

### **Brassica oleracea Alboglabra-Gruppen** daggekål

Namn baserat på *Brassica oleracea* var. *alboglabra* (L.H.Bailey) Sun. (Aldén & al. 2009) och motsvarar *B. oleracea* Kailaan Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Sorter vars blomknoppar, blad och stjälkar smakar som och används ungefär som broccoli.

**Sortexempel:** 'Green Lance'

### **Brassica oleracea Bladbroccoli-Gruppen** bladbroccoli

Representerar en sydeuropeisk kåltyp med sorter vars plana grågröna blad och små, om broccoli påminnande, bladskott används som kokta.

**Sortexempel:** 'Spigariello' (ett oklart namn)

### **Brassica oleracea Botrytis-Gruppen** blomkål

Namn baserat på *Brassica oleracea* var. *botrytis* L. (Aldén & al. 2009) och motsvarar *B. oleracea* Cauliflower Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn).

**Sortexempel:** 'King'

### **Brassica oleracea Broccolo-Gruppen** broccolo

Namn baserat på den i svensk handel vanligen förekommande beteckningen broccolo på denna kåltyp (se t.ex. Israelsson 2000). Sorter som i både utseende och smak är ett mellanting mellan föräldrarna blomkål och broccoli (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Romanesco Natalino'



*Brassica oleracea* (Botrytis-Gruppen) 'King'  
Foto: Svein Solberg, Nordgen

### **Brassica oleracea Capitata-Gruppen** huvudkål

Namn baserat på *Brassica oleracea* var. *capitata* L. Ett sammelnamn för sorter som i SKUD placerats i Grupperna *B. oleracea* Alba-Gruppen (vitkål), Conica-Gruppen (spetskål), Rubra-Gruppen (rödkål) och Sabauda-Gruppen (savojkål) (Aldén & al. 2009).

### **Brassica oleracea Conica-Gruppen** spetskål

Namn baserat på *Brassica oleracea* var. *capitata* f. *conica* Lam. (Aldén & al. 2009). Sorter jämfört med vitkål med något lösare knutna, elliptiska eller tillspetsade huvud av blad med mild smak. Även rödbladiga sorter inkluderas.

**Sortexempel:** 'Express'

### **Brassica oleracea Costata-Gruppen** portugisisk kål

Namn baserat på *Brassica oleracea* var. *costata* DC. (Wiersema & León 2013) och motsvarar *B. oleracea* Tronchuda Group (Facciola 1998, Aldén & al. 2009) och *B. oleracea* Portuguese Kale Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Sorter av typen bladkål vars ofta mycket stora blad används i grytor, smoothies etc.

**Sortexempel:** 'Penca Póvoa Verde'

### **Brassica oleracea Daggbroccoli-** **Gruppen**

daggbroccoli

Barroso 2014. Sorter som härstammar från hybrider mellan broccoli och daggekål. Motsvarar engelskans "tenderstem broccoli". Liknar broccoli men har spädare stjälkar och mindre, glesare blomställningar.

**Sortexempel:** 'Green Inspiration'

### **Brassica oleracea Gemmifera-Gruppen** brysselkål

Namn baserat på *Brassica oleracea* var. *gemmifera* DC. (Aldén & al. 2009) och motsvarar *B. oleracea* Brussels Sprouts Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn).

**Sortexempel:** 'Red Bull'

### **Brassica oleracea Gongylodes-** **Gruppen**

kålrabbi

Namn baserat på *Brassica oleracea* var. *gongylodes* L. (Aldén & al. 2009) och motsvarar *B. oleracea* Kohlrabi Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Sorter med uppsvälld stamdel som används både färsk och tillagad.

**Sortexempel:** 'Superschmelz'

### **Brassica oleracea Italica-Gruppen** broccoli

Namn baserat på *Brassica oleracea* var. *italica* Plenck (Aldén & al. 2009) och motsvarar *B. oleracea* Broccoli Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn).

**Sortexempel:** 'Aquiles'



*Brassica oleracea* (Italica-Gruppen) 'Aquiles'  
Foto: Blomsterlandet

Lite kass k  
300 dpi

### **Brassica oleracea Medullosa-Gruppen** fodermärgkål

Namn baserat på *Brassica oleracea* var. *medullosa* Thell. (Aldén & al. 2009) och motsvarar *B. oleracea* Marrowstem Kale Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Sorter används som foder och ses i synnerhet i viltåkrar.

**Sortexempel:** 'Camaro'

### **Brassica oleracea Palmifolia-Gruppen** palmkål

Namn baserat på *Brassica oleracea* var. *palmifolia* DC. (Aldén & al. 2009) och motsvarar *B. oleracea* Jersey Kale eller Palmtree Kale Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Sorter med rätt smala mörkt blågröna och buckliga blad samlade i en palmlik krona.

**Sortexempel:** 'Nero di Toscana'

### **Brassica oleracea Prydnadskål-Gruppen** prydnadskål

Namn baserat på benämningen prydnadskål (Dahlmark 1926, Gréen 1984). Sorter vars huvudsakliga användning är som prydnad ute eller dekoration till maträtter (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Coral Queen'

### **Brassica oleracea Ramosa-Gruppen** grenkål

Namn baserat på *Brassica oleracea* var. *ramosa* DC. (Aldén & al. 2009) och motsvarar *B. oleracea* Thousand Head Kale Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Fleråriga sorter, men ofta odlade som ettåriga, som vanligen är storgrova, sällan blommande och vars blad och unga skott används som grönsak. Namngivna sorter ännu ej påträffade i Sverige. Det gamla svenska namnet buskkål, som använts i SKUD, är ett flertydigt namn som använts om flera kålgrupper samt för stäppkål, *Crambe cordifolia*. Här presenteras det nya namnet grenkål, efter epitetet "ramosa", som betyder grenig.

### **Brassica oleracea Rosett-Gruppen** rosettkål

Namn baserat på handelns benämning rosettkål (se t.ex. Weibulls fröpåsar) för sorter som är ett mellanting mellan föräldrarna brysselkål och grönkål, med löst knutna bladrosetter längs stjälken.

**Sortexempel:** 'Autumn Star'

### **Brassica oleracea Rubra-Gruppen** rödkål

Namn baserat på *Brassica oleracea* var. *rubra* L. (Aldén & al. 2009) och motsvarar *B. oleracea* Red Cabbage Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn).

**Sortexempel:** 'Topas'

### **Brassica oleracea Sabauda-Gruppen** savojkål

Namn baserat på *Brassica oleracea* var. *sabauda* L. (Aldén & al. 2009) och motsvarar *B. oleracea* Savoy Cabbage Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Sorter med mörkgröna, vackert krusiga blad i löst knutna huvuden.

**Sortexempel:** 'Marner Grüfawi'

### **Brassica oleracea Sabellica-Gruppen** grönkål

Namn baserat på *Brassica oleracea* var. *sabellica* L. (Aldén & al. 2009) och motsvarar *B. oleracea* Acephala Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn).

**Sortexempel:** 'Høj Amager'



*Brassica oleracea* (Sabellica-Gruppen) 'Høj Amager'. Foto: Svein Solberg, Nordgen



### **Brassica oleracea Vinterbroccoli-Gruppen** vinterbroccoli

Namn baserat på handelns benämning vinterbroccoli (se t.ex. Lindblom 2016) för sorter av brocolityp med många små, blomkålslika huvuden. Motsvarar engelskans "sprouting broccoli". Flertalet sorter övervintras och skördas först på senvintern-våren. Vissa sorter kan alternativt placeras i *B. oleracea Italica*-Gruppen.

**Sortexempel:** 'Santee'

### **Brassica oleracea Viridis-Gruppen** foderkål

Namn baserat på *Brassica oleracea* var. *viridis* L. (Aldén & al. 2009) och motsvarar *B. oleracea* Collard Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Ofta mer än meterhöga, storbladiga sorter av typen bladkål använda både som foder och människoföda.

**Sortexempel:** 'Jerseykål'

### **Brassica rapa Annua-Gruppen** vårrybs

Namn baserat på *Brassica rapa* subsp. *oleifera* f. *annua* (Metzg.) Thell. (Wiersema & León 2013) och motsvarar *B. rapa* Summer Turnip Rape Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Sorter för oljeframställning som sås på våren för skörd samma år.

**Sortexempel:** 'SW Petita'

### **Brassica rapa Biennis-Gruppen** höstrybs

Namn baserat på *Brassica rapa* subsp. *oleifera* f. *biennis* (Metzg.) Thell. och motsvarar *B. rapa* Winter Turnip Rape Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Sorter för oljeframställning som sås på hösten för skörd året därpå. De unga plantorna övervintrar (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Largo'

### **Brassica rapa Chinensis-Gruppen** sellerikål

Namn baserat på *Brassica chinensis* L. (Aldén & al. 2009) och motsvarar *B. rapa* Pak Choi Group (Wiersema & León 2013,

som alternativnamn). Kinesisk bladgrönsak, ofta kallad pak choi, vars sorter har vita, stora, uppsvällda bladstjälkar och mörkgröna bladskivor, vilka används råa eller oftare kokta, stekta eller friterade.

**Sortexempel:** 'Arax'

### **Brassica rapa Narinosa-Gruppen** tatsoikål

Namn baserat på *Brassica narinosa* L.H.Bailey. (Aldén & al. 2009) och motsvarar *B. rapa* Taatsai Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Av somliga ibland inkluderad i Chinensis-Gruppen. Asiatisk bladgrönsak, något lik sellerikål, men tatsoikål har rosetter av ganska små, plattade och rundade blad som liksom bladskäften främst används som wokade.

**Sortexempel:** 'Rozetto'



*Brassica rapa* Narinosa-Gruppen.

Foto: Runåbergs Fröer

### **Brassica rapa Nipposinica-Gruppen** mizunakål

Namn baserat på *Brassica nipposinica* L.H.Bailey (Aldén & al. 2009) och motsvarar *B. rapa* Mizuna Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Japansk bladgrönsak vars sorter har mycket finflikiga, nästan om rucola påminnande blad, men av mild kålsmak, som kan ätas färska eller tillagade.

**Sortexempel:** 'Kyona Mizuna'



*Brassica rapa* (Nipposinica-Gruppen) 'Kyona Mizuna'. Foto: Runåbergs Fröer



### **Brassica rapa Oleifera-Gruppen** rybs

Namn baserat på *Brassica campestris* var. *oleifera* DC. (Aldén & al. 2009) och motsvarar *B. rapa* Turnip Rape Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Alternativ placeringsfacilitet för samtliga rybssorter. Här fördelade på *B. rapa* Annua- och Biennis-Grupperna, se dessa.

### **Brassica rapa Parachinensis-Gruppen** blomsellerikål

Namn baserat på *Brassica parachinensis* L.H.Bailey (Aldén & al. 2009) och motsvarar *B. rapa* Caisin Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Av somliga ibland inkluderad i Chinensis-Gruppen (pak choi) men utvecklades parallellt med denna i C Kina. Sorter vars unga mjälla skott med blommor används tillagade (Siemonsma & Piluek 1993).

**Sortexempel:** 'Fortuna'

### **Brassica rapa Pekinensis-Gruppen** salladskål

Namn baserat på *Brassica pekinensis* (Lour.) Rupr. (Aldén & al. 2009) och motsvarar *B. rapa* Chinese Cabbage Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn).

**Sortexempel:** 'Eswe'



*Brassica rapa* Pekinensis-Gruppen.  
Foto: Annette Hägnefelt, Nordgen

### **Brassica rapa Perviridis-Gruppen** komatsuna

Namn baserat på *Brassica perviridis* (L.H.Bailey) L.H.Bailey (Aldén & al. 2009) och motsvarar *B. rapa* Neep Greens Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Japansk grönsak med spatelformade, helbräddade blad. De unga bladen har en mild smak med visst "senapssting" och kan ätas färska, medan äldre blad och skott behöver tillagas.  
**Sortexempel:** 'Malachai'

### **Brassica rapa Purpuraria-Gruppen** purpursellerikål

Namn baserat på *Brassica rapa* var. *purpuraria* (L.H.Bailey) Kitam. (Aldén & al. 2009). Sorter med relativt tunna, närmast helbräddade blad, purpurfärgade bladskäft och stjälkar, som tillsammans med blomställningarna används kokta eller friterade.

**Sortexempel:** 'Hon Tsai Tai'



*Brassica rapa* (Rapifera-Gruppen) 'Gränsrova'.  
Foto: Matti Leino



*Capsicum annuum* (Chilipeppar-Gruppen)  
'Cheyenne'. Foto: Blomsterlandet

### **Brassica rapa Rapifera-Gruppen** rova

Namn baserat på *Brassica rapa* subsp. *rapifera* Metzg. och motsvarar *B. rapa* Vegetable Turnip, Fodder Turnip och delvis Neep Greens Groups (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Här ingår majrovor och foderrovor (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Gränsrova'

### **Brassica rapa Ruvo-Gruppen** broccolirybs

Namn baserat på *Brassica ruvo* L.H.Bailey (Aldén & et al. 2009) och motsvarar *B. rapa* Broccolietto Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Sorter med blommor i rätt glest packade och små huvuden jämfört med broccoli. Blad och huvuden används vanligen kokta och har en svagt bitter smak.

**Sortexempel:** 'Sessantina'

### **Brassica rapa Trilocularis-Gruppen** indisk rybs

Namn baserat på *Brassica rapa* subsp. *trilocularis* (Roxb.) Hanelt (Aldén & al. 2009) och motsvarar *B. rapa* Yellow Sarson Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). En indisk bladgrönsak vars oljerika frön även används för produktion av matolja. Namngivna sorter ännu ej påträffade i Sverige.

### **Capsicum annuum Chilipeppar-Gruppen** chilipeppar

Namn baserat på det svenska namnet för kryddstarka sorter av *Capsicum annuum* (se t.ex. Eriksen & al. 2013). Sorter vanligen med kryddheta, tunnväggiga frukter av skiftande form och färg. Används som färska, torkade, rökta eller malda. Namn som 'Anaheim', 'Ancho' (Poblano), 'De Árbol', 'Jalapeño', 'Mulato', 'Pasilla' och 'Pequin' betecknar ofta inte bara en distinkt sort utan även en Grupp av snarlika sorter. En annan typ av "namn", i SKUD redigerade som handelsbeteckningar, är närmast att betrakta som Grupp-namn (ofta s k frukttypnamn) eller t o m inhemska namn. Det finns således ingen distinkt sort med motsvarande namn, även om de i handeln ibland behandlas som sorter. Hit hör Cayenne, New Mexican, Serrano och Wax (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Cheyenne'

### **Capsicum annuum** **Körbärspaprika-Gruppen** körbärspaprika

Namn baserat på en i handeln vanlig beteckning för upprätta eller hängande sorter med små körbärshövdade, milda eller heta frukter (se t.ex. Impecta 2022). Många sorter kan alternativt placeras i Prydnadschili-Gruppen (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Cherry Chocolate'

### **Capsicum annuum Paprika-Gruppen** paprika

Namn efter det svenska namnet på milda sorter av *Capsicum annuum*. Sorter med vanligen rätt stora, tjockväggiga och söta (sällan heta) frukter. Liksom chilipeppar klassificeras paprikasorter i USA i frukttyper efter form och användning. Sådana är Bell, Pimento (Pimiento) och Tomato (Cheese eller Squash) (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Ramiro'

### **Capsicum annuum** **Prydnadschili-Gruppen** prydnadschili

Namn baserat på den svenska beteckningen prydnadschili (se t.ex. Jalapeno.nu) för sorter med upprätta eller mer sällan hängande, mest



koniska frukter, som kan vara mycket heta, i första hand odlade som prydnad. Små- och rundfruktiga sorter kan alternativt placeras i Körsbärspaprika-Gruppen (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Bolivian Rainbow'

#### **Cichorium endivia Crispum-Gruppen** friséesallat

Namn baserat på *Cichorium endivia* var. *crispum* Lam. (Aldén & al. 2009). Lågvuxna sorter med rätt smala, krusiga, fransade eller inskurna blad.

**Sortexempel:** 'Fijne Krul Groen'

#### **Cichorium endivia Latifolium-Gruppen** escarolesallat

Namn baserat på *Cichorium endivia* var. *latifolium* Lam. (Aldén & al. 2009). Tämmligen storvuxna och bredbladiga sorter med ofta vriden bladbas.

**Sortexempel:** 'Natacha'

#### **Cichorium intybus Foliosum-Gruppen** cikoriasallat

Namn baserat på *Cichorium intybus* var. *foliosum* Hegi s.str. och *C. intybus* Foliosum group (Hanelt & al. 2001). Sorter vars bleka skott, framtagna efter drivning, används som sallad (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Witloof'

#### **Cichorium intybus Rosensallat** **Gruppen** rosensallat

Namn baserat på den svenska beteckningen rosensallat (se t.ex. Eriksen & al. 2013) för sorter med röda eller rosa blad som används som sallad (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Mesola'

#### **Cichorium intybus** **Sallatscikoria-Gruppen** sallatscikoria

Namn baserat på den svenska beteckningen sallatscikoria (se t.ex. Eriksen & al. 2013) för sorter med antingen täta, koniskt huvudlika bladsamlingar eller med mer löst sittande, långa maskrosliknande blad. De senare ibland kallade "Catalogna" (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Molfetta'

#### **Cichorium intybus Sativum-Gruppen** rotcikoria

Namn baserat på *Cichorium intybus* var. *sativum* Lam. (Aldén & al. 2009) och motsvarar *C. intybus* Sativum group (Hanelt & al. 2001). Sorter vars uppsvällda rot används till olika ändamål.

**Sortexempel:** 'Fredonia'



*Citrus x aurantium* Amara-Gruppen.

Foto: Växtfakta i Lund

#### **Citrus x aurantium Amara-Gruppen** pomerans

Namn baserat på *Citrus x aurantium* var. *amara* L. (Aldén & al. 2009) och motsvarar *C. x aurantium* Sour Orange Group (Mabberley 2017). Namngivna sorter ännu ej påträffade i Sverige.

#### **Citrus x aurantium Myrtifolia-Gruppen** chinotto

Namn baserat på *Citrus myrtifolia* Raf. (Aldén & et al. 2009). Vanligaste sorten är 'Large Chinotto' som dock inte påträffats i Sverige ännu.

#### **Citrus x aurantium Nobilis-Gruppen** tangor

Namn baserat på *Citrus x nobilis* Lour. (Aldén & al. 2009) och motsvarar *C. x aurantium* Tangor Group (Mabberley 2017).

**Sortexempel:** 'Ortanique'

#### **Citrus x aurantium Paradisi-Gruppen** grapefrukt

Namn baserat på *Citrus x paradisi* MacFad. (Aldén & al. 2009) och motsvarar *C. x aurantium* Grapefruit Group (Mabberley 2017). Sorter med rödaktigt fruktkött brukar kallas blodgrape.

**Sortexempel:** 'Star Ruby'

**Citrus x aurantium Sinensis-Gruppen**  
apelsin

Namn baserat på *Citrus x sinensis* (L.)  
Osbeck (Aldén & al. 2009) och motsvarar *C.*  
*x aurantium* Sweet Orange Group (Mabberley  
2017).

**Sortexempel:** 'Sanguinello'



*Citrus x aurantium* (Tangelo-Gruppen) UGLI  
(varumärke). Foto: Växtfakta i Lund

**Citrus x aurantium Tangelo-Gruppen**  
tangelo

Namn baserat på *Citrus x tangelo* J.W.Ingram  
& H.E.Moore (Aldén & al. 2009) och  
motsvarar *C. x aurantium* Tangelo Group  
(Mabberley 2017).

**Sortexempel:** UGLI (varumärke)

**Citrus japonica Margarita-Gruppen**  
oval kumquat

Namn baserat på *Citrus margarita* Lour.  
(Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Nagami'

**Citrus x limon Bergamia-Gruppen**  
bergamott

Namn baserat på *Citrus x bergamia* (Risso)  
Risso & Poit. (Aldén & al. 2009), inkluderad i  
*C. x limon* i t.ex. Mabberley 2017. Namngivna  
sorter ännu ej påträffade i Sverige.

**Citrus x limon Limetta-Gruppen**  
limett

I SKUD tidigare förd till *Citrus x aurantium*.  
Namn baserat på *C. x limetta* Risso. Aldén &  
al. 2009.

**Sortexempel:** 'Oroblanco'



*Citrus japonica* Margarita-Gruppen.  
Foto: Växtfakta i Lund

**Citrus reticulata Clementina-Gruppen**  
klementin

Namn baserat på *Citrus x clementina*  
Tanaka (Aldén & al. 2009) och motsvarar *C.*  
*reticulata* 'Clementine' (Wiersema & León  
2013).

**Sortexempel:** 'Hernandia'

**Citrus reticulata Deliciosa-Gruppen**  
medelhavsmandarin

Namn baserat på *Citrus deliciosa* Ten. (Aldén  
& al. 2009), av de flesta inkluderad i *C.*  
*reticulata* Blanco. Beträffande det svenska  
namnet mandarin har det använts för snart  
sagt samtliga småfruktiga *reticulata*-typer  
och bör därför inte användas för någon  
distinkt sort eller Grupp. Sannolikt motsvarar  
dock Deliciosa-Gruppen de klassiska  
mandarintyperna (= medelhavsmandariner)  
från 1800-talet. Få namngivna sorter, men  
beteckningar som Avana, Chios och Emperor



ses ibland, och kan eventuellt motsvara distinkta sorter. För övriga småcitrusorter hänvisar vi till *C. reticulata* Clementina-, Tangerina- och Unshiu-Grupperna.

### **Citrus reticulata Tangerina-Gruppen** tangerin

Namn baserat på *Citrus tangerina* Tanaka (Aldén & al. 2009) och motsvarar *C. reticulata* 'Tangerina' (Wiersema & León 2013).

**Sortexempel:** 'Dancy'

### **Citrus reticulata Unshiu-Gruppen** satsuma

Namn baserat på *Citrus unshiu* (Makino) S.Marcov (Aldén & al. 2009) och motsvarar *C. reticulata* 'Unshio' (Wiersema & León 2013).

**Sortexempel:** 'Owari'

### **Coffea arabica Bourbon-Gruppen** bourbonkaffe

Aldén & al. 2009. Sorter härstammande från kaffefrukter som togs från Yemen till Réunion (f.d. Isle de Bourbon) i början av 1700-talet. Den ursprungliga sorten 'Bourbon' odlas ännu. Kaffet som dricks idag kan sällan hänföras till någon distinkt sort utan består vanligen av blandningar av olika sorter.

### **Coffea arabica Typica-Gruppen** typicakaffe

Aldén & al. 2009. Sorter härstammande från de första kloner som fördes till Indien i slutet av 1600-talet från odlad kaffe i Yemen. Ursprungsklonen, sorten 'Typica', som ännu odlas, uppstod/härstammar dock från vegetativt material från en odlad planta på Java som togs till Amsterdam i början på 1700-talet och kom att odlas i växthus i några botaniska trädgårdar i Europa. Denna klon spreds under 1700-talet till USA. Liksom bourbonkaffe urskiljs knappast distinkta kloner i brukarledet. Kaffet vi dricker är ofta en blandning av olika sorter.

### **Corylus Hasselnöt-Gruppen** hasselnöt

Fruktsorter av hasselarter, ibland med oklar bakgrund, men tillhörande antingen *Corylus avellana*, *avellana* x *maxima* eller *maxima*

(Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Cosford'

### **Cucumis melo Cantaloupe-Gruppen** cantaloupemelon

Namn baserat på *Cucumis melo* L. var. *cantalupo* Ser. och motsvarar *C. melo* Cantaloupe group (Hanelt & al. 2001) och Cantalupensis Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Inkluderar s.k. charentaismeloner. Gruppen omfattar ej nätmelonerna, se Reticulatus-Gruppen. Sorter med tjockt, strävt, vårtigt eller fjälligt skal utan nätmönster (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Charentais'



*Cucumis melo* (Cantaloupe-Gruppen)  
'Charentais'. Foto: Björn Aldén

### **Cucumis melo Conomon-Gruppen** orientalisk melon

Namn baserat på *Cucumis conomon* Thunb. och motsvarar *C. melo* Conomon Group (Facciola 1998, Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Östasiatiska sorter vanligen med långsträckta, ljusskaliga frukter, vilka mest används som "pickles" i inläggningar (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Prolific'

### **Cucumis melo Dudaim-Gruppen** mangomelon

Namn baserat på *Cucumis melo* var. *dudaim* (L.) Naudin. Motsvarar *C. melo* Dudaim group (Facciola 1998, Hanelt & al. 2001) och *C. melo* Dudaim Group samt Chito Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Ofta aromatiska, småfruktiga sorter. Hos oss mest som prydnad. Äts annars färska eller som inlagda (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** QUEEN ANNE'S POCKET MELON

Lite kass kv  
300 dpi

(ett troligen ogiltigt sortnamn och är det engelska namnet på mangomelon)

### **Cucumis melo Flexuosus-Gruppen** gurkmelon

Namn baserat på *Cucumis flexuosus* L. och motsvarar *C. melo* Flexuosus Group (Facciola 1998, Wiersema & León 2013, som alternativnamn) och Grönsaksmelon-gruppen (Eriksen & al. 2013). Sorter med runda eller långsträckta frukter, vilka används omogna som grönsak (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Abruzzese Chiaro'



*Cucumis melo* (Honungsmelon-Gruppen) 'Jaune Canary 1'. Foto: Björn Aldén

### **Cucumis melo Honungsmelon-Gruppen** honungsmelon

Namn baserat på den svenska beteckningen honungsmelon (se t.ex. Eriksen & al. 2013) och motsvarar *C. melo* Honungsmelon-gruppen (Eriksen & al. 2013) och engelskans "honeydew melons". Sent mognande sorter utan myskarom. Skal vanligen slätt (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Jaune Canary 1'

### **Cucumis melo Inodorus-Gruppen** cassabamelon

I SKUD tidigare som *Cucumis melo* Cassaba-Gruppen. Namn baserat på *Cucumis melo* L. var. *inodorus* H. Jacq. och motsvarar *C. melo* Inodorus Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Sent mognande sorter utan myskarom. Skal strävt (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'St. Nick'

### **Cucumis melo Makuwa-Gruppen** koreansk melon

Namn baserat på *Cucumis melo* var. *makuwa* Makino och motsvarar *C. melo* Makuwa Group (Lim 2012). Sorter med rätt små, 10-20 cm långa, äggformade eller avlånga frukter med tunt gult skal och små frön. Smak ibland beskriven som ett mellanting mellan gurka och honungsmelon. Hela frukten kan ätas.

**Sortexempel:** 'Sakata's Sweet'

### **Cucumis melo Reticulatus-Gruppen** nätmelon

Namn baserat på *Cucumis melo* var. *reticulatus* Ser., av somliga inkluderad i *C. melo* Cantaloupe group (Hanelt & al. 2001). Motsvarar engelskans "musket or netted melons". Sorter med starkt nätnervigt skal och tydlig myskarom (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Aroma'



*Cucumis melo* (Reticulatus-Gruppen) 'Aroma'  
Foto: Blomsterlandet

### **Cucumis sativus Druvgurka-Gruppen** druvgurka

Namn baserat på den sedan gammalt etablerade svenska beteckningen druvgurka (se t.ex. Lundén 1912) för sorter med mestadels små och korta frukter, vilka i första hand används för inläggning (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Västerås'

### **Cucumis sativus Slanggurka-Gruppen** slanggurka

Namn baserat på den sedan gammalt

etablerade svenska beteckningen slanggurka (se t.ex. Linell & Hylander 1955) för sorter med mestadels stora, avlånga frukter för direktkonsumtion eller inläggning (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Bella'

### **Cucumis sativus Vitskaliga Gruppen** vitgurka

Namn baserat på det faktum att sorterna i Gruppen har närmast pigmentfria, vita skal. De är i första hand avsedda för inläggning (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Arboga'



*Cucumis sativus* (Vitskaliga Gruppen)  
'Arboga' Foto: Matti Leino

### **Cucurbita maxima Hubbard-Gruppen** hubbardpumpa

Namn baserat på och motsvarar *Cucurbita maxima* Hubbard group (Hanelt & al. 2001, Aldén & al. 2009) och Hubbard squash (Facciola 1998). Sorter av typen vinterpumpa. Några av dem kallas ibland hokkaidopumpa - en äldre beteckning för hårdigare sorter som till en början förädlades i norra Japan. Andra s k hokkaidopumpor placeras i SKUD i Kabocha-Gruppen eller direkt under *C. maxima*.

**Sortexempel:** 'Fictor'

### **Cucurbita maxima Kabocha-Gruppen** kabochapumpa

Namn baserat på och motsvarar *Cucurbita* Kabocha group (Hanelt & al. 2001) och Kabocha squash (Facciola 1998). Inkluderar



*Cucurbita maxima* (Hubbard-Gruppen)  
'Fictor'. Foto: Leif Lindblom

här s k Buttercup-pumpor. Sorter av typen vinterpumpa och mestadels av ren *C. maxima*, mer sällan ur korsningen *C. maxima* x *moschata*, ursprungligen förädlade i Japan och Australien/Nya Zeeland. Kabocha är det japanska ordet för pumpa.

**Sortexempel:** 'Delica'

### **Cucurbita maxima Mammoth-Gruppen** mammutpumpa

Namn baserat på och motsvarar *Cucurbita maxima* Mammoth group (Hanelt & al. 2001). Innefattar främst storfruktigare utställningssorter av typen vinterpumpa (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Atlantic Giant'

### **Cucurbita maxima Turban-Gruppen** turbanpumpa

Namn baserat på den svenska beteckningen turbanpumpa (se t.ex. Eriksen & al. 2013) och motsvarar *Cucurbita maxima* Turban group (Hanelt & al. 2001). Sorter av typen vinterpumpa som mest används som prydnad (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Aladdin's Turban'

### **Cucurbita pepo Acorn-Gruppen** ollonpumpa

Namn baserat på och motsvarar *Cucurbita pepo* Acorn group (Hanelt & al. 2001) och Acorn squash (Facciola 1998). Placeras ibland under *C. ovifera* L. = *pepo* subsp. *ovifera* (L.) D.S.Decker. Består både av buskformiga och rankande sorter i huvudsak av typen vinterpumpa.

**Sortexempel:** 'Celebration'

Lite kass kv  
300 dpi



### **Cucurbita pepo Aurantia-Gruppen** apelsinpumpa

Namn baserat på *Cucurbita aurantia* Willd. och motsvarar *C. pepo* Aurantia group (Hanelt & al. 2001). Rankande sorter med små, runda, vårtiga och orange frukter. Sorter kan alternativt placeras i Prydnadspumpa-Gruppen (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Orange Warty'

### **Cucurbita pepo Delicata-Gruppen** delicata-pumpa

Namn baserat på och motsvarar *Cucurbita pepo* Delicata group (Hanelt & al. 2001). Medelstora, avlånga eller mer rundade sorter av typen vinterpumpa med ätligt, vitt till gult, grön- till orangerandigt skal.

**Sortexempel:** 'Zeppelin Delicata'

### **Cucurbita pepo Pajpumpa-Gruppen** pajpumpa

Namn baserat på den i svensk handel vanliga beteckningen pajpumpa (se t.ex. Impecta 2022) och motsvarar *Cucurbita pepo* Pumpkin group (Hanelt & al. 2001) liksom engelska beteckningar som "field and pie pumpkins". Mest rankande (krypande), små- och storfruktiga sorter av typen vinterpumpa. Används både för hushållsbruk och som prydnad (halloweenpumpa) (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Harvest Moon'



*Cucurbita pepo* (Pajpumpa-Gruppen)  
'Harvest Moon'. Foto: Björn Aldén

### **Cucurbita pepo Prydnadspumpa-Gruppen** prydnadspumpa

Namn baserat på den svenska beteckningen prydnadspumpa (se t.ex. Eriksen & al. 2013) och motsvarar *Cucurbita pepo* Ornamental gourd group (Hanelt & al. 2001). Mest oätliga, rankande (krypande) sorter av typen vinterpumpa, med små till medelstora, släta, runda till ovala frukter av skiftande färg.

Småfruktiga sorter med vårtigt och orange skal placeras dock i Aurantia-Gruppen. De fullt ätliga, men till prydnad kanske oftare använda s.k. halloween-sorterna placeras primärt i Pajpumpa-Gruppen men kan alternativt placeras här (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Baby Bear'

### **Cucurbita pepo Scallop-Gruppen** tefatspumpa

Namn baserat på och motsvarar *Cucurbita pepo* Scallop group (Hanelt & al. 2001) och Scallop squash (Facciola 1998). Samtliga sorter med buskformigt växtsätt och tefatsformade frukter av typen sommarpumpa (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Lillesol'



*Cucurbita pepo* (Scallop-Gruppen) 'Lillesol'.  
Foto: Leif Lindblom

### **Cucurbita pepo Skruvhals-Gruppen** skruvhalspumpa

Namn baserat på den i svensk handel vanliga beteckningen skruvhalspumpa (se t.ex. Eriksen & al. 2013) och motsvarar *Cucurbita pepo* Crookneck group (Hanelt & al. 2001 m.fl.) och Skruvhalspumpa-gruppen (Eriksen & al. 2013). Sorter vanligen små, gula med böjd hals av typen sommarpumpa (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Yellow Crookneck'

**Cucurbita pepo**  
**Spagettipumpa-Gruppen**  
spagettipumpa

Namn baserat på den i svensk handel vanliga beteckningen spagettipumpa (se t.ex. Eriksen & al. 2013) och motsvarar *Cucurbita pepo* Vegetable spaghetti group, (Hanelt & al. 2001), Spaghetti squash (Facciola 1998) och Spagettipumpa-gruppen (Eriksen & al. 2013). Sorter av typen sommarpumpa, vanligen med gula, cylindriska frukter och ett fruktkött som efter kokning trådar sig likt spagetti. Moderna sorter använda som lågkalorisubstitut för spagetti (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Vegetable Spaghetti'

**Cucurbita pepo Straightneck-Gruppen**  
smörpumpa

Namn baserat på och motsvarar *Cucurbita pepo* Straightneck group (Hanelt & al. 2001). Cylindriska sorter av typen sommarpumpa med vanligen smörgult, glänsande skal där den smala halslika delen är rak, till skillnad från den hos de snarlika men krökta skruvhalspumporna.

**Sortexempel:** 'Yellow Straightneck'

**Cucurbita pepo Styriaca-Gruppen**  
nakenfröpumpa

Namn baserat på *Cucurbita pepo* var. *styriaca* Greb. och motsvarar *C. pepo* Styrian hulless group (Hanelt & al. 2001). Både rankande och buskformiga sorter med skalfria oljerika frön, som används för oljeframställning eller direkt som livsmedel (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Olga'

**Cucurbita pepo Zucchini-Gruppen**  
squash

Namn baserat på *Cucurbita pepo* Zucchini group (Hanelt & al. 2001) och Zucchini (Facciola 1998). Gruppen, vars indelning följer Andres 1995, innefattar här även mörgpumpor, *Cucurbita pepo* var. *medullosa* C.Harz, i Hanelt et al. 2001 benämnda Vegetable marrow group samt Cocozelle group (Hanelt et al. 2001). Aldén & al. 2009.

**Sortexempel:** 'Striato d'Italia'



*Cucurbita pepo* (Zucchini-Gruppen) 'Striato d'Italia'. Foto: Leif Lindblom

**Cynara cardunculus Kardon-Gruppen**  
kardon

Namn baserat på det svenska namnet för *Cynara cardunculus* (se t.ex. Holzhausen 1938) och motsvarar *C. cardunculus* Cardoon Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn).

**Sortexempel:** 'Gigante di Romania'

**Cynara cardunculus Scolymus-Gruppen**  
kronärtskocka

Namn baserat på *Cynara scolymus* L. och motsvarar *C. cardunculus* Scolymus Group (Aldén & al. 2009, Wiersema & León 2013, som alternativnamn).

**Sortexempel:** 'Imperial Star'



*Cynara cardunculus* (Scolymus-Gruppen) 'Imperial Star'. Foto: Leif Lindblom

Lite kass kv  
300 dpi



**Festuca rubra Kortrhizom-Gruppen**  
greenrödsvingel

Sorter med korta utlöpare (Aldén & al. 2009, Molteberg & Aamlid 2007).

**Sortexempel:** 'Joppa'

**Festuca rubra Långrhizom-Gruppen**  
ruffrödsvingel

Sorter med långa utlöpare (Aldén & al. 2009, Molteberg & Aamlid 2007).

**Sortexempel:** 'Gondolin'

**Festuca rubra Tätvuxna Gruppen**  
tuvrödsvingel

Sorter utan eller endast med rudimentära utlöpare (Aldén & al. 2009, Molteberg & Aamlid 2007).

**Sortexempel:** 'Wilma'

**Ficus carica Adriaafikon-Gruppen**  
adriaafikon

Namn baserat på och motsvarar *Ficus carica* Adriaafikon-gruppen (Engstrand & Widén 2002). Partenokarpa sorter, dvs. sorter som sätter frukt utan att behöva pollineras av getfikon (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Brown Turkey'

**Ficus carica San Pedrofikon-Gruppen**  
sanpedrofikon

Namn baserat på och motsvarar *Ficus carica* San Pedrofikon-gruppen (Engstrand & Widén 2002). Sorter intermediära mellan smyrna- och adriaafikon. Andra skörden kräver kaprifikation, dvs. pollinering av getfikon (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'King'

**Ficus carica Smyrnafikongruppen**  
smyrnafikongruppen

Namn baserat på och motsvarar *Ficus carica* Smyrnafikongruppen (Engstrand & Widén 2002). Sorter som för att sätta frukt kräver kaprifikation, dvs. pollinering av getfikon (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Sari Lop'

**Foeniculum vulgare Azoricum-Gruppen**  
sötfänkål

Namn baserat på *Foeniculum vulgare* var. *azoricum* (Mill.) Thell. (Aldén & al. 2009). och motsvarar *F. vulgare* Azoricum

Group (Facciola 1998) och Florence Fennel Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Den uppsvällda stambasen med bladslidor används som grönsak (Linell & Hylander 1955).

**Sortexempel:** 'Selma'

**Foeniculum vulgare Dulce-Gruppen**  
kryddfänkål

Namn baserat på *Foeniculum vulgare* var. *dulce* (Mill.) Batt. & Trab. (Aldén & al. 2009) och motsvarar *F. vulgare* Sweet Fennel Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn) och Krydd- eller Dulce-Gruppen (Engstrand & Widén 2017). Frukterna ("fröna") används som krydda (Linell & Hylander 1955).

**Sortexempel:** COMMON (troligen ogiltigt namn)

**Foeniculum vulgare Rödblådiga Gruppen**  
bronsfänkål

Rödblådiga sorter av fänkål (Aldén & al. 2009). Används mest som prydnadsväxt, ibland som kryddväxt.

**Sortexempel:** 'Giant Bronze'



*Glebionis coronaria* Spatiosa-Gruppen

Foto: Runåbergs Fröer

**Glebionis coronaria Spatiosa-Gruppen**  
sallatskranskrage

Namn baserat på *Chrysanthemum coronarium* var. *spatiosum* L.H.Bailey (Aldén & al. 2009). En i asiatiska rätter ofta använd bladkrydda som kokt, fräst eller wokad. I handeln ofta såld under namnet



Shungiku, ett japanskt namn på växten och inte ett sortnamn. Namngivna sorter ännu ej påträffade i Sverige.

### **Hordeum vulgare Coeleste-Gruppen nakenkorn**

Namn baserat på *Hordeum vulgare* var. *coeleste* L. och motsvarar *H. vulgare* Cerinus-Coeleste Group (Facciola 1998). Innefattar även *H. distichon* var. *nudum* L., vilket innebär att sorter kan höra både till sexrads- och tvåradskorn. Fröet (kärnan) är löst omgivet av ytter- och inneragn och därför mer eller mindre naket. Borstlösa typer finns (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Tinkel'

### **Hordeum vulgare Distichon-Gruppen tvåradskorn**

Namn baserat på *Hordeum vulgare* subsp. *distichon* (L.) Körn. Sorter där endast det mellersta småaxet av de tre bildar frön. Beroende på såtiden kan sorter även rubriceras som höstkorn eller vårkorn (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Östgöta Flättring'



*Hordeum vulgare* (Distichon-Gruppen)  
'Östgöta Flättring'. Foto: Matti Leino

### **Hordeum vulgare Hexastichon-Gruppen sexradskorn**

Namn baserat på *Hordeum hexastichon* L. Gruppen omfattar även *H. tetrastichum* Stokes. Sorter där alla i gruppen om tre småax utbildar frön. Beroende på småaxens ställning i axet i förhållande till axspindeln har tidigare urskilts vanligt sexradskorn och fyrradskorn där mellersta småaxet sitter tätt intill axspindeln bildande sexkantiga eller fyrkantiga ax, samt stjärnkorn, där småaxen är jämnt och stjärnlikt placerade runt axspindeln. Beroende på såtiden kan sorter även rubriceras som höstkorn eller vårkorn (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'SW Judit'

### **Hordeum vulgare Zeochriton-Gruppen skyffelkorn**

Namn baserat på *Hordeum zeocriton* L., en mycket gammal korntyp av kulturursprung med korta och tjocka ax med ett karakteristiskt utseende p g a av de utspärrade agnarna med långa borst. Namngivna sorter ännu ej påträffade i Sverige.

### **Lactuca sativa Angustana-Gruppen sparrissallat**

I SKUD tidigare som Asparagina-Gruppen. Namn baserat på *Lactuca sativa* var. *angustana* Irish (Bailey 1900-1902) och motsvarar Angustana Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Grupp med få namngivna sorter med förtjockade, spröda stjälkar med sparrisliknande smak, vilka likt bladen används färska eller kokta (Aldén & al. 2009).



*Lactuca sativa* Angustana-Gruppen.  
Foto: Runåbergs Fröer

### **Lactuca sativa Capitata-Gruppen** huvudsallat

Namn baserat på *Lactuca sativa* var. *capitata* L. och motsvarar *L. sativa* Butterhead och Crisphead groups (Hanelt & al. 2001) liksom *L. sativa* Crisphead (Iceberg eller Cabbage) and Butterhead Lettuce Groups (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Sorter med små runda huvud av löst packade, mjuka blad ("butterheads") eller större huvuden av tätare packade, ofta krispiga blad ("crispheads"). Till den sista typen hör isbergssallat och bataviasallat. Sorter som ibland förs till Latin group (Hanelt & al. 2001) placeras också här. (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Salmini'



*Lactuca sativa* (Capitata-Gruppen) 'Salmini'.  
Foto: Svein Solberg, Nordgen

### **Lactuca sativa Crispa-Gruppen** plocksallat

Namn baserat på *Lactuca sativa* var. *crispa* L. och motsvarar *L. sativa* Cutting or Curled Lettuce Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Sorter med vanligen tunna, löst anordnade, vågiga, loberade eller fransiga, gröna eller rödanlupna blad (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Lollo Rosso'

### **Lactuca sativa Longifolia-Gruppen** bindsallat

I SKUD tidigare som *Lactuca sativa* Romana-Gruppen. Namn baserat på *L. sativa* L. var. *longifolia* Lam. och motsvarar *L. sativa* Cos or Romaine Lettuce Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Kallas

ibland romansallat i handeln. Sorter med långa, breda, upprätta, i spetsen tunna, vid basen tjocka, krispiga blad som bildar huvud (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Little Gem'

### **Lagenaria siceraria Clavata-Gruppen** herkulesklubba

Namn baserat på *Lagenaria vulgaris* var. *clavata* Ser. (Candolle 1828). Sorter med klubblika frukter.

**Sortexempel:** 'Maranka'

### **Lagenaria siceraria Cougourda-Gruppen** hävertkurbits

Namn baserat på *Lagenaria vulgaris* var. *cougourda* Ser. (Candolle 1828) och *Lagenaria siceraria* var. *cougourda* (Ser.) Hara (Aldén & al. 2009). Sorter med stora flaskliknande frukter med rak eller böjd hals. Namngivna sorter ännu ej påträffade i Sverige.

### **Lagenaria siceraria Depressa-Gruppen** plattkurbits

Namn baserat på *Lagenaria leucantha* var. *depressa* (Ser.) Makino (Makino 1952). Sorter med breda, flata och päronlika frukter, med rätt långt skaft. Namngivna sorter ännu ej påträffade i Sverige.

### **Lagenaria siceraria Gourda-Gruppen** pilgrimsflaska

I SKUD tidigare som *L. siceraria* Typica-Gruppen. Namn baserat på *Lagenaria vulgaris* var. *gourda* Ser. (Candolle 1828) och motsvarar *Cucurbita lagenaria* f. *gurda* Svenss. (Svensson 1893). Sorter med flasklika frukter med kort, upptill bukig hals.

**Sortexempel:** 'Jeanny'

### **Lagenaria siceraria Longissima-Gruppen** cylinderpumpa

Namn baserat på bl.a. *Cucurbita lagenaria* L. f. *longissima* Svenss. (Svensson 1893) och *L. siceraria* 'Longissima' (Facciola 1998). Sorter med ofta meterlånga, raka eller korvformigt böjda cylindriska och tjockväggiga frukter.

**Sortexempel:** 'Serpente de Sicilia'

### **Lagenaria siceraria Pyrotheca-Gruppen**

kruthornspumpa

Namn baserat på *Cucurbita leucantha pyrotheca* hort. (Noisette 1825) och *Cucurbita lagenaria* f. *pyrotheca* Svenss. (Svensson 1893). Sorter med små, kruthornslika frukter. Namngivna sorter ännu ej påträffade i Sverige.

### **Lansium domesticum Duku-Gruppen duku**

Namn baserat på *Lansium domesticum* var. *duku* Hassk. (Kostermans 1966, Aldén & al. 2009). Sorter med klotrunda frukter med tämligen tjockt fruktskal (Verheij & Coronel 1991). Namngivna sorter ännu ej påträffade i Sverige.

### **Lansium domesticum Duku-Langsat-Gruppen**

duku-langsat

Aldén & al. 2009. Sorter som är intermediära mellan Duku- och Langsat-Gruppens sorter (Verheij & Coronel 1991). Namngivna sorter ännu ej påträffade i Sverige.

### **Lansium domesticum Langsat-Gruppen**

langsat

Namn baserat på ett av de inhemska namnen, langsat, för *Lansium domesticum* Corrêa (Kostermans 1966, under *Aglaia domestica*). Sorter med äggrunda frukter och tjockare skal än hos Duku-Gruppens sorter (Verheij & Coronel 1991). Namngivna sorter ännu ej påträffade i Sverige.

### **Larix sibirica Ledebourii-Gruppen rysslärk**

Namn baserat på *Larix ledebourii* (Rupr.) Cinovskis. En typ av sibirisk lärk från N Europa som botaniskt avviker föga från den i huvudsak asiatiska *L. sibirica*, men som har stor relevans i kulturskogssammanhang då den till skillnad från *L. sibirica* s.str. kan odlas i sydligare och mindre kontinentala delar av Nord- och Centraleuropa (Aldén & al. 2009). Namngivna sorter ännu ej påträffade i Sverige.



*Lansium domesticum* Langsat- och Duku Grupperna. Foto: Växtfakta i Lund

### **Linum usitatissimum Oljelin-Gruppen oljelin**

Namn baserat på den svenska beteckningen oljelin (se t.ex. Linnell & Hylander 1955, Osvald 1959) för mer lågvuxna, rikt förgrenade och rikblommiga sorter som används för i huvudsak oljeframställning

**Sortexempel:** 'Omega'

### **Linum usitatissimum Spånadslin-Gruppen spånadslin**

Namn baserat på den svenska beteckningen spånadslin (se t.ex. Linnell & Hylander 1955, Osvald 1959). Mer högvuxna och mer eller mindre ogrenade sorter, som används i huvudsak som fiberväxter.

**Sortexempel:** 'Blenda'





*Linum usitatissimum* (Spånadslin-Gruppen)  
'Blenda'. Foto: Matti Leino

**Lolium multiflorum**  
**Westerwoldicum-Gruppen**  
westerwoldiskt rajgräs

Namn baserat på *Lolium multiflorum* var. *westerwoldicum* Wittm. Sorter i huvudsak använda till foder (Aldén & al. 2009).  
**Sortexempel:** 'Swale'

**Lolium perenne Grönyte-Gruppen**  
parkrajgräs

Sorter avsedda för grönytor (Aldén & al. 2009).  
**Sortexempel:** 'SW Corvus'

**Lolium perenne Vallgräs-Gruppen**  
foderrajgräs

Sorter i första hand avsedda för foder (Aldén & al. 2009).  
**Sortexempel:** 'Tivoli'

**Mentha x piperita Citrata-Gruppen**  
citrusmynta

Namn baserat på *Mentha x piperita* var. *citrata* (Ehrh.) Briq. (Mabberley 2017, Stace 2019).  
**Sortexempel:** 'Lime'

**Musa Dessertbanan-Gruppen**  
banan

Sorter mestadels härstammande ur *Musa acuminata* Colla, mer sällan *M. x paradisiaca* L. = *acuminata* x *balbisiana*. Stor- eller småfruktiga sorter med sött fruktkött vanligen för direktkonsumtion. Indelas ofta i grupper med bokstavskombinationer efter fördelningen av föräldra-arternas genom (arvs massa) där A = *acuminata*-genom och B = *balbisiana*-genom (Aldén & al. 2009).  
**Sortexempel:** 'Valery'

**Musa Kokbanan-Gruppen**  
kokbanan

Vanligen triploida sorter av *Musa x paradisiaca* L. med minst ett genom från *M. balbisiana* Colla. Någon sort med endast *balbisiana*-genom förekommer (i övrigt se Dessertbanan-Gruppen). Vanligen småfruktiga sorter i de flesta fall avsedda för kokning (oskalade) eller stekning (skalade) (Aldén & al. 2009).  
**Sortexempel:** 'Bluggoe'

**Oryza sativa Glutinosa-Gruppen**  
klibbris

Namn baserat på *Oryza glutinosa* Lour. En Grupp mer av historiskt intresse som samlar sorter med mycket amyloextrin och låg amylohalt, vilket gör att kornen klibbar ihop efter kokning (Aldén et al. 2009).

**Oryza sativa Indica-Gruppen**  
indiaris

Namn baserat på *Oryza sativa* subsp. *indica* Kato (Purseglove 1981) och motsvarar *O. sativa* Indica group (Hanelt & al. 2001). Klassificeras ibland som ekogeografisk ras eller "cultivar group" (Hanelt et al. 2001). I handeln sällan namngivna, långkorniga sorter (Aldén & al. 2009), framför allt odlade i tropiska områden.  
**Sortexempel:** 'Jasmine'

### **Oryza sativa Japonica-Gruppen** japonicaris

Namn baserat på *Oryza sativa* subsp. *japonica* Kato (Purseglove 1981) och motsvarar *O. sativa* Japonica group (Hanelt & al. 2001). Klassificeras ibland som ekogeografisk ras eller "cultivar group" (Hanelt et al. 2001), som dessutom kan delas upp i tre olika typer. Rund- och mellanlångkorniga sorter (Aldén & al. 2009) framför allt odlade i tempererade områden.

**Sortexempel:** 'Carnaroli'

### **Oryza sativa Montana-Gruppen** bergis

Namn baserat på *Oryza montana* Lour. (Aldén & al. 2009). En Grupp mestadels av historiskt intresse som samlar sorter lämpade för "torr" kultur. Namngivna sorter ännu ej påträffade i Sverige.

### **Petroselinum crispum** **Foliosum-Gruppen** bladpersilja

Namn baserat på *Petroselinum hortense* Hoffm. var. *foliosum* (Alef.) Thell. (Hanelt & al. 2001, Aldén & al. 2009). Krusbladiga och slätbladiga sorter vars blad används som krydda eller grönsak.

**Sortexempel:** 'Darki'

### **Petroselinum crispum** **Tuberosum-Gruppen** rotpersilja

Namn baserat på *Petroselinum crispum* subsp. *tuberosum* (Rchb.) Soó och motsvarar *P. crispum* Tuberosum Group (Wiersema & Léon 2013, som alternativnamn). Sorter vars rötter, som påminner om palsternackor, används tillagade eller råa i sallader.

**Sortexempel:** 'Bero'

### **Phaseolus vulgaris Brytböna-Gruppen** brytböna

Namn baserat på det svenska namnet på bönsorter med smala, trinda eller platta, gröna eller purpurfärgade baljor, som används omogna och hela efter kokning. Både klättrande (störbönor) och buskformiga (buskbönor) sorter förs hit. En speciell sorttyp är pärlbönor med små platta baljor som redan på ett tidigt stadium har tydligt framträdande



*Phaseolus vulgaris* (Kokböna-Gruppen)  
'Morbrors Gröna'.

Foto: Svein Solberg, Nordgen

frön (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Marché de Genève'

### **Phaseolus vulgaris Kokböna-Gruppen** kokböna

Namn baserat på det svenska namnet på bönsorter vars mogna och torkade frön används efter kokning. Både klättrande (störbönor) och buskformiga (buskbönor) sorter förs hit. Fröskalens färg används ofta för att gruppera sorter. Benämningar som brun böna, röd kidneyböna, spräcklig böna, svart böna och vit böna används då. Hos en sorttyp, flageoletböna, används även de omogna fröna och baljorna som färska. Ej sällan saknas sortnamn, varvid handelsbeteckningar som "bruna bönor", "flageoletbönor" och "svarta bönor" får beteckna flera olika sorter (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Morbrors Gröna'

### **Phaseolus vulgaris Skärböna-Gruppen** skärböna

Namn baserat på det svenska namnet på bönsorter vars breda, platta, vanligen gröna baljor används omogna och skurna i bitar efter kokning. Både klättrande (störbönor) och buskformiga (buskbönor) sorter förs hit (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Admires'

### **Phaseolus vulgaris Vaxböna-Gruppen** vaxböna

Namn baserat på det svenska namnet på bönsorter vars smala, trinda eller platta, gula eller vita baljor används omogna och ofta hela efter kokning. Både klättrande (störbönor)

och buskformiga (buskbönor) sorter förs hit (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Asarum'



*Pisum sativum* (Brytmärgärt-Gruppen)  
'Klenshyttan'. Foto: Svein Solberg, Nordgen

#### ***Pisum sativum* Brytmärgärt-Gruppen brytmärgärt**

Namn baserat på det svenska namnet på ärtsorter med tjock baljvägg där endast de skrynkliga fröna ("ärtorna") äts. Motsvarar, tillsammans med Märgärt-Gruppen, *P. sativum* Medullare Group (= *P. sativum* convar. *medullare* Alef.) hos Porcher 2007 (som alternativnamn).

**Sortexempel:** 'Klenshyttan'

#### ***Pisum sativum* Brytsockerärt-Gruppen brytsockerärt**

Namn baserat på det svenska namnet på ärtsorter med släta frön och tjock, vanligen rund balja. Hela baljan med de ofta omogna fröna används. Motsvarar, tillsammans med Sockerärt-Gruppen, *P. sativum* Round-podded Group hos Porcher 2007 (som alternativnamn).

**Sortexempel:** 'Sugar Snap'


#### ***Pisum sativum* Foderärt-Gruppen foderärt**

Namn baserat på det svenska namnet på ärtsorter vars torkade frön mest används som djurfoder, men ibland även som grönsak. Balja vanligen tunnväggig. Frön släta, mer sällan skrynkliga. Somliga sorter kan alternativt föras till *P. sativum* Kokärt-Gruppen. Beteckningen gråärt är vanlig för sorter med färgade blommor.  
**Sortexempel:** 'Ingrid'

#### ***Pisum sativum* Kokärt-Gruppen kokärt**

Namn baserat på det svenska namnet på ärtsorter vars gula eller gröna frön torkas och används efter kokning. Somliga sorter kan alternativt föras till Foderärt-Gruppen (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Torsdagsärt'



*Pisum sativum* (Kokärt-Gruppen)  
'Torsdagsärt'. Foto: Svein Solberg, Nordgen

#### ***Pisum sativum* Märgärt-Gruppen märgärt**

Namn baserat på det svenska namnet på ärtsorter med tunnväggig balja vars skrynkliga eller buckliga, men söta, frön används (Aldén & al. 2009). Motsvarar, tillsammans med Brytmärgärt-Gruppen, *P. sativum* Medullare Group hos Porcher 2007 (som alternativnamn). Några särskilt högvuxna sorter kallas för stensärt. De bär namnet efter Stens gård, Graversfors, Östergötland, där den ursprungliga stensärten togs fram.

**Sortexempel:** 'Alunda'

tråkig bil

Lite kass  
300 dpi





*Pisum sativum* (Märgärt-Gruppen) 'Alunda'.  
Foto: Svein Solberg, Nordgen

### ***Pisum sativum* Sockerärt-Gruppen sockerärt**

Namn baserat på det svenska namnet på söta ärtsorter med platt, tunnväggig balja. Hela baljan med de omogna fröna används. Motsvarar, tillsammans med Brytsockerärt-Gruppen, *Pisum sativum* Round-podded Group hos Porcher 2007 (som alternativnamn). Märgsockerärt betecknar sorter av den vanliga sockerärtstypen med skrynkliga frön.

**Sortexempel:** 'Engelsk Sabel'



*Pisum sativum* (Sockerärt-Gruppen) 'Engelsk Sabel'. Foto: Svein Solberg, Nordgen

### ***Pisum sativum* Spritärt-Gruppen spritärt**

Namn baserat på det svenska namnet på ärtsorter vars färska, eller mer sällan torkade, frön används. Frön släta. Balja tunnväggig. Motsvarar *Pisum sativum* Vulgare Group hos Porcher 2007 (som alternativnamn). Sorter

med blå balja kallas ofta blåärt (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Visingsö'

### ***Pisum sativum* Umbellatum-Gruppen kronärt**

Namn baserat på *Pisum sativum* var. *umbellatum* L. Sorter som karakteriseras av att baljorna sitter i flock. Används som sockerärt. En Grupp av i huvudsak historiskt intresse. Namngivna sorter ännu ej påträffade i Sverige.

### ***Prunus cerasifera* Myrobalan-Gruppen myrobalanplommon**

Namn baserat på *Prunus myrobalana* (L.) Loisel. och *P. cerasifera* 'Myrobalan', ett i handeln förr ofta förekommande namn på en eller flera sorter, främst använda som plommongrundstam.

**Sortexempel:** 'Myrobalan B'



*Prunus cerasifera* Myrobalan-Gruppen.  
Foto: Björn Aldén

### ***Prunus domestica* Grön Reine Claude-Gruppen grön reineclaude**

Namn baserat på *Prunus domestica* GRÖN REINE CLAUDE, en sortbeteckning som tidigare använts i plantskolor (se t.ex. Bergianska 1937), men som kan innefatta alla grönfruktiga sorter av Reine Claude-typ (Aldén & al. 2009). Grupp-namnet motsvarar och kan användas för grönskaliga, men okända sorter av det som gått under beteckningen *P. domestica* Reine Claude-gruppen (Dahl 1943).

**Sortexempel:** 'Stor Grön Reine Claude'

Lite kass kv  
300 dpi

kvalitet i

**Prunus persica var. nucipersica**  
**Saturnusnektarin-Gruppen**  
saturnusnektarin

Namn baserat på utseendet hos de plattade frukterna, som påminner om planeten Saturnus med sina ringar, vilket också är i analogi med saturnuspersika. I engelskspråkig litteratur är ett av namnen Saturn nectarine. Förenklat kan det fulla namnet också skrivas *Prunus persica* Saturnusnektarin-Gruppen.  
**Sortexempel:** 'Platerina 110'

**Raphanus sativus Caudatus-Gruppen**  
ormrättika

Namn baserat på *Raphanus caudatus* L.f. och motsvarar *R. sativus* Caudatus Group (Facciola 1998) och *R. sativus* Rat-Tailed Radish Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Sorter vars frukter används som grönsak. Skidorna kan bli mer än 30 cm långa.  
**Sortexempel:** 'Radies von Madras'

**Raphanus sativus Daikon-Gruppen**  
daikon

Namn baserat på det i svensk handel ofta använda japanska namnet för rättiksorter med avlånga, oftast minst 20-30 cm långa, (sällan runda och mindre) vita eller (sällan) röda rotfrukter bestående av både hypokotyl och rot-del. Blad mer sträva än dem hos sorterna i *R. sativus* Lo Bok-Gruppen (Aldén & al. 2009).  
**Sortexempel:** 'Tokinashi'

**Raphanus sativus Lo Bok-Gruppen**  
kinesisk rättika

Namn baserat på det kinesiska namnet på rättiksorter härstammande från Kina och Korea eller är förädlade ur sådana. Skillnaden mot de japanska sorterna i Daikon-Gruppen, vilka ofta likställs när det gäller användningsområde, är relativt liten. Själva rotfrukten är av varierande färg, avlång eller ofta rundad, kal, ofta minst 10 cm lång men sällan så stor som de i Daikon-Gruppen, bestående av både hypokotyl och rot-del. Smak något mildare och blad vanligen släta och mer lättuggade än dem i *R. sativum* Daikon-Gruppen (Aldén & al. 2009).  
**Sortexempel:** 'Red Meat'

**Raphanus sativus Oleiformis-Gruppen**  
oljerättika

Namn baserat på *Raphanus sativus* var. *oleiformis* Pers. (Aldén & al. 2009) och motsvarar *R. sativus* Oleiformis Group (Facciola 1998) och Leaf Raddish Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Sorter används mest som saneringsväxt mot nematoder men även som gröngödsel eller viltfoder.  
**Sortexempel:** 'Final'

**Raphanus sativus Rädisa-Gruppen**  
rädisa

Namn baserat på det svenska namnet på sorter med rundade (med eller utan spets) eller avlånga, 3-10 cm långa, vita till rosenröda (sällan gula) rotfrukter. De runda bestående av hypokotyl, de avlånga även av rot. Smak vanligen mild. Kort säsong, skördas vanligen tidigt (Aldén & al. 2009).  
**Sortexempel:** 'Saxa 2'



*Raphanus sativus* (Rädisa-Gruppen) 'Saxa 2'.  
Foto: Blomsterlandet

**Raphanus sativus Rättika-Gruppen**  
rättika

Namn baserat på det svenska namnet på sorter med avlånga eller mer rundade, ofta minst 10 cm långa, rotfrukter. De klassiska är avlånga bestående av både hypokotyl och rot, de modernare kortare bestående mest av hypokotylen. Klassiska sorter med skarp smak, svarta och sena, men även tidiga liksom bruna, rosa och vita sorter med mildare smak finns numera. Gränsen mot

rädisa således ej skarp. Innefattar här ej de orientaliska sorterna ("Oriental radishes"), se Daikon- och Lo Bok-Grupperna (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Noir Gros Long d'Hiver de Paris'

### **Ribes Grossularia-Gruppen** trädgårdskrusbär

Namn baserat på *Ribes* undersläkte *Grossularia* (Mill.) Pers. Bristfällig information och komplex förädlingshistoria försvårar fördelningen av sorter på taxa inom undersläktet. De flesta tillhör dock *Ribes uva-crispa*, men enstaka kan även tillhöra följande arter eller hybrider: *R. x arcuatum* = *hirtellum* x *missouriense*, *R. divaricatum*, *R. x innominatum* = *divaricatum* x *uva-crispa*, *R. niveum* x *uva-crispa*, *R. x rusticum* = *hirtellum* x *uva-crispa* och *R. x utile* = *cynosbati* x *uva-crispa* (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** HINNONMÄKI RÖD ('Hinnonmäen Punainen')



*Ribes* (Grossularia-Gruppen) HINNONMÄKI RÖD ('Hinnonmäen Punainen'). Foto: Sveplant

### **Ribes Krusvinbär-Gruppen** krusvinbär

Sorter av mest tagglösa buskar med bär som ett mellanting mellan krusbär och svarta vinbär, både i smak och utseende (i något fall enligt uppgift med inslag av röda vinbär) därav Grupp-namnet. Hybrider mellan *Ribes* Grossularia-Gruppen (krusbär s.l.), *R. nigrum* och *R. rubrum*. Inkluderar *R. x culverwellii*, *R. x nidigrolaria* och den mer komplexa hybriden med *R. rubrum* (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Josta'



*Ribes* (Vita Vinbär-Gruppen) 'Vit Jätte'.

Foto: Björn Aldén

### **Ribes Röda Vinbär-Gruppen** röda vinbär

Rödfruktiga vinbärssorter hörande till *Ribes rubrum*, *R. x houghtonianum*, *R. x pallidum* och möjligen också *R. petraeum* och *R. spicatum* (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Jonkeer van Teets'

### **Ribes Vita Vinbär-Gruppen** vita vinbär

Vitfruktiga vinbärssorter av *Ribes rubrum*, *R. petraeum* och *R. x pallidum* (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Vit Jätte'

### **Rosmarinus officinalis** **Prostratus-Gruppen** kryprosmarin

Namn baserat på *Rosmarinus officinalis* var. *prostratus* Mazziari (WSCP 2021) och motsvarar *R. officinalis* Prostratus Group (Lord 2007). Lågvuxna sorter i huvudsak använda som örterkrydda.

**Sortexempel:** 'Capri'

### **Rubus Trädgårdsbjörnbär-Gruppen** trädgårdsbjörnbär

I SKUD tidigare benämnd *Rubus* Björnbär-Gruppen. Mest björnbärslika sorter som är artsselektioner av eller av mer komplex hybridbakgrund inom i huvudsak *Rubus*-sektionerna *Corylifolii* och *Moriferi*, ibland benämnda *Rubus fruticosus* s.l. Av praktiska skäl kan några björnbärsliknande sorter, där även *R. idaeus* ingår, placeras här.

**Sortexempel:** 'Bedford Giant'



### **Rubus Björnbärshallon-Gruppen** björnbärshallon

Sorter som är relativt hallonlika men komplexa hybrider mellan hallon och olika björnbärsarter. Bland använda björnbär finns amerikanska arter som *Rubus argutus*, *R. baileyanus* och *R. ursinus* och europeiska arter som *R. nitidifolius* och *R. ulmifolius*. Gruppen inkluderar även sorter av *R. loganobaccus* och hybrider med denna (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Boysen'

### **Rubus Hösthallon-Gruppen** hösthallon

Mestadels hallonlika, på årsskotten om hösten fruktbarande sorter av *Rubus idaeus* eller av hybridbakgrund där förutom *R. idaeus*, arter som t.ex. *R. odoratus* och *R. occidentalis* kan ingå (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Autumn Bliss'



*Rubus* (Hösthallon-Gruppen) 'Autumn Bliss'.  
Foto: Sveplant

### **Rubus Trädgårdshallon-Gruppen** trädgårdshallon

I SKUD tidigare som *Rubus* Hallon-Gruppen. Sommarbarande hallonsorter som är selektioner av eller hybrider med *Rubus idaeus* L. Inkluderar hybrider mellan de två underarterna *R. idaeus* subsp. *idaeus* och subsp. *strigosus*, liksom primärhybrider och återkorsningar mellan *R. idaeus* och *R. occidentalis* = *R. x neglectus*, förr kallade

hallonbjörnbär, samt även hallonlika sommarbarande sorter av mer komplex bakgrund, t ex *R. idaeus* x *loganobaccus*. (Aldén & al. 2009). Sistnämnda kan alternativt placeras i *R. Björnbärshallon-Gruppen*.

**Sortexempel:** 'Veten'



*Rubus* (Trädgårdshallon-Gruppen) 'Veten'.  
Foto: Sveplant

### **Salix Viminalis-Gruppen** viminalis-vide

Selektioner av *Salix viminalis* L. samt hybrider mellan denna och i huvudsak *S. schwerinii* (Aldén & al. 2009). Snabbvuxna och smalbladiga sorter med huvudinfluenser från *S. viminalis* framtagna för produktion av biobränsle.

**Sortexempel:** 'SW Inger'

### **Solanum tuberosum Phureja-Gruppen** inkapotatis

Namn baserat på *Solanum phureja* Juz. & Bukasov (= *tuberosum* subsp. *andigenum*) och motsvarar *S. tuberosum* Phureja Group (Ramsay & Bryan 2011). Sorter av vanligen komplexa hybrider mellan *S. tuberosum* subsp. *andigenum* och subsp. *tuberosum*, genetiskt ibland närmande sig subsp. *andigenum*. Används ofta som s.k. delikatesspotatis.

**Sortexempel:** 'Inca Bell'

**Solanum tuberosum**  
**Fabrikspotatis-Gruppen**  
fabrikspotatis

Namn baserat på rubriceringen fabrikspotatis (Osvald 1965, Jordbruksverket 2020).

En av Jordbruksverkets tre kategorier av potatissorter som innefattar sorter för industriell produktion av stärkelse och foder.

**Sortexempel:** 'Producent'

**Solanum tuberosum**  
**Färskpotatis-Gruppen**  
färskpotatis

Namn baserat på rubriceringen färskpotatis (Osvald 1965, Jordbruksverket 2020).

En av Jordbruksverkets tre kategorier av potatissorter som avser sorter som skördas före fullständig mognad, vars skal enkelt kan avlägsnas utan skalning. Här placeras SKUD även s.k. sommarpotatis, sorter som skördas skalmogen eller praktiskt taget skalmogen för försäljning direkt efter skörd (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Swift'

**Solanum tuberosum**  
**Höst- och Vinterpotatis-Gruppen**  
vinterpotatis

Namn baserat på rubriceringen höst- och vinterpotatis (Osvald 1965, Jordbruksverket 2020). En av Jordbruksverkets tre kategorier av potatissorter som avser hållbara sorter skördade sent på säsong. Mindre lagringsbara sorter, ibland benämnda sommarpotatis, förs i SKUD vanligen till Färskpotatis-Gruppen. Några sorter används i huvudsak till chips (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'King Edward'

**Sorghum bicolor Saccharatum-Gruppen**  
sockerdurra

Namn baserat på *Sorghum saccharatum* (L.) Moench (Aldén & al. 2009). Sorter ingår i importfoder samt används för framställning av bl.a. sirap (Linell & Hylander 1955) och alkohol. Namngivna sorter ännu ej påträffade i Sverige.

**Sorghum bicolor Technicum-Gruppen**  
kvastdurra

Namn baserat på *Sorghum saccharatum* var. *technicum* (Körn.) Doronina & Ivanjuk (Aldén & al. 2009, WCSP 2021). Sorter används i olika typer av flätverk och t.ex. i kvastar (Linell & Hylander 1955) och penslar.

**Sortexempel:** 'Gammalsvenskbyn'

**Triticum aestivum Compactum-Gruppen**  
kubbvete

Namn baserat på *Triticum compactum* Host. = *T. aestivum* subsp. *compactum* (Host) Mac Key (Wiersema & León 2013) och motsvarar *T. aestivum* Compactum Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn, Mabberley 2017). Sorter med kompakta och korta ax och styva strån. Namngivna sorter ännu ej påträffade i Sverige.



*Triticum aestivum* Compactum-Gruppen.  
Foto: Matti Leino

### **Triticum aestivum Höstvete-Gruppen** höstvete

Namn baserat på den för sorterna lämpligaste tiden för sådd, nämligen hösten. Till Gruppen kan också föras s.k. växelveten, dvs. sorter som kan lämpa sig både för höst- och vårsådd. (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Kosack'

### **Triticum aestivum Spelta-Gruppen** speltvete


Namn baserat på *Triticum spelta* L. = *T. aestivum* subsp. *spelta* (L.) Thell. (Wiersema & León 2013) och motsvarar *T. aestivum* Spelta Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn, Mabberley 2017). Sorter med sköra, lätt sönderfallande ax. Speltvete, även kallat dinkelvete, odlas i Sverige framför allt på Gotland och har ungefär samma användning som "brödvete", *T. aestivum* subsp. *aestivum*.

**Sortexempel:** 'Ostro'

### **Triticum aestivum Vårvete-Gruppen** vårvete

Namn baserat på den för sorterna lämpligaste tiden för sådd, nämligen våren. Till Gruppen kan också föras s.k. växelveten, dvs. sorter som kan lämpa sig både för höst- och vårsådd (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Ölands Lantvete'



*Triticum aestivum* (Vårvete-Gruppen) 'Ölands Lantvete'. Foto: Svein Solberg, Nordgen

### **Triticum turgidum Dicoccon-Gruppen** emmervete

Namn baserat på *Triticum turgidum* subsp. *dicoccon* (Schränk) Thell. (Wiersema & León 2013) och motsvarar *T. turgidum* Dicoccon Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn, Mabberley 2017). Hos oss sällan odlade, bredbladiga sorter med ax försedda med långa borst. Mestadels som import av fullkorn för t.ex. gröt och öltillverkning.

**Sortexempel:** 'Vit Gotland'

### **Triticum turgidum Durum-Gruppen** durumvete

Namn baserat på *Triticum durum* Desf. = *T. turgidum* subsp. *durum* (Desf.) van Slageren (Wiersema & León 2013, GRIN 2021) och motsvarar *T. turgidum* Durum Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn, Mabberley 2017). Hos oss sällan odlade sorter med ax försedda med långa borst och frön med svagt gulaktiga, hårda kärnor. Används ofta till pasta.

**Sortexempel:** 'Rosadur'

### **Triticum turgidum Polonicum-Gruppen** polskt vete

Namn baserat på *T. polonicum* L. = *T. turgidum* subsp. *polonicum* (L.) Thell. (Wiersema & León 2013) och motsvarar *T. turgidum* Polonicum Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn, Mabberley 2017). Sorter med långa borst och mer utdragna agnar och kärnor än vanligt vete. Namngivna sorter ännu ej påträffade i Sverige.

### **Triticum turgidum Turanicum-Gruppen** khorasanvete

Namn baserat på *Triticum turgidum* subsp. *turanicum* (Jakubz.) Á.Löve & D.Löve och motsvarar *T. turgidum* Turanicum Group (GRIN 2021, som alternativnamn). Förhållandevis oförädlade sorter med långborstiga ax och osedvanligt stora, proteinrika kärnor.

**Sortexempel:** AMUT ('QK-77')



### **Vaccinium Angustifolium-Gruppen** hybridblåbär

Namn motsvarar *Vaccinium Angustifolium*-Ryhmä (Räty 2017). Hybrider mellan *Vaccinium angustifolium* Aiton och *V. corymbosum*, inklusive återkorsningar. Jämfört med de ofta mer än meterhöga sorterna av *V. corymbosum*, som kallas highbush i Nordamerika, visar denna Grupp sorter tydliga drag av *V. angustifolium*, är mer lågvuxna, sällan mer än 50-60 cm (kallas "halfhigh" i Nordamerika) och vanligen något hårdigare (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Northblue'

### **Vicia faba Equina-Gruppen** hästböna

Namn baserat på *Vicia faba* var. *equina* (Medik.) Pers. (Wiersema & León 2013). Övergångar till *V. faba* Minuta-Gruppen finns. Frön i snitt större än hos åkerbönan, men mindre än hos de egentliga bondbönorna *V. faba* var. *faba*. Huvudsaklig användning som foder (förr).

**Sortexempel:** 'Ditmarscher Marschbohne'

### **Vicia faba Minuta-Gruppen** åkerböna

Namn baserat på *Vicia faba* var. *minuta* (Alef.) Mansf. (Wiersema & León 2013). Sorter oftast med förhållandevis korta och rundade baljor samt små, vanligen mer eller mindre runda frön (Aldén & al. 2009). Används både som grönsak och foder samt till gröngödsling.

**Sortexempel:** 'Taifun'



*Vicia faba* (Minuta-Gruppen) 'Taifun'.  
Foto: Björn Aldén

### **Vigna unguiculata Biflora-Gruppen** katjangböna

Namn baserat på *Dolichos biflorus* L.f. och motsvarar *V. unguiculata* Biflora Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Sorter vars omogna baljor, liksom frön, används i huvudsak som grönsak (Aldén & al. 2009). Namngivna sorter ännu ej påträffade i Sverige.

### **Vigna unguiculata** **Sesquipedalis-Gruppen** långböna

Namn baserat på *Vigna unguiculata* subsp. *sesquipedalis* (L.) Verdc. och motsvarar *V. unguiculata* Sesquipedalis Group (Wiersema & León 2013, som alternativnamn). Sorter vars hela, omogna baljor används färska eller efter kokning (Aldén & al. 2009).

**Sortexempel:** 'Red Noodle'

### **Vitis Labrusca-Gruppen** labruskavin

Namn baserat på *Vitis labrusca* L., vars gener bidragit till viktiga egenskaper hos sorterna. Sorter i huvudsak ur hybriden *V. labrusca* x *vinifera* = *V. x alexanderi*, men kan också vara selektioner av ren *V. labrusca* eller av andra labrusca-hybrider, t.ex. *V. labrusca* x *vulpina*. I några östeuropeiska sorter ingår även *V. amurensis* (Aldén & al. 2009). Sorter ursprungligen framtagna för sin resistens mot den amerikanska vinlusen (*Daktulosphaira vitifoliae*) senare även för sin bättre hårdighet jämfört med *V. vinifera*.

**Sortexempel:** 'Schuyler'



*Vitis* (Labrusca -Gruppen) 'Schuyler'.  
Foto: Sveplant

### **Zea mays Amylacea-Gruppen**

#### **mjölmajs**

Aldén & al. 2009. Namn baserat på *Zea mays* var. *amylacea* (Sturtev.) L.H.Bailey (Bailey 1900-1902). Förutom till mjöl och gryn används sorterna för framställning av stärkelse och alkohol.

**Sortexempel:** 'Painted Mountain'

### **Zea mays Dentiformis-Gruppen**

#### **tandmajs**

Aldén & al. 2009. Namn baserat på *Zea mays* var. *dentiformis* (Körn.) Asch. & Graebn. (Hanelt et al. 2001). Sorter med gula eller vita, om tänder påminnande majskorn med hög stärkelsehalt som används både till foder och matolja.

**Sortexempel:** 'Leucodon'

### **Zea mays Fodermajs-Gruppen**

#### **fodermajs**

Aldén & al. 2009. Namn baserat på sorternas främsta användningsområde, som foder. Vanligen korsningar mellan sorter inom både *Zea mays* Indurata-Gruppen och *Z. mays* Dentiformis-Gruppen.

**Sortexempel:** 'Tango'

### **Zea mays Indurata-Gruppen**

#### **flintmajs**

Aldén & al. 2009. Namn baserat på *Zea mays* var. *indurata* (Sturtev.) L.H.Bailey (Bailey 1900-1902). Sorter med hårt fröskal och majskorn av skiftande färg.

**Sortexempel:** 'Mutin'

### **Zea mays Microsperma-Gruppen**

#### **popmajs**

Aldén & al. 2009. Namn baserat på *Zea mays* var. *microsperma* (Körn.) Asch. & Graebn. Sorter vars främsta användning är som popcorn.

**Sortexempel:** 'Tom Thumb'

### **Zea mays Prydnadsmajs-Gruppen**

#### **prydnadsmajs**

Namn baserat på sorternas främsta användningsområde, som prydnad. Gruppen innefattar sorter med randiga blad, *Z. mays* var. *japonica* (WCSP 2021), sorter med små, ofta bjärt färgade kolvar, *Z. mays* var. *gracillima* (WCSP 2021) och sorter där kolvarna omsluts av violetta hölsterlika slidor,

*Z. mays* var. *curagua* (WCSP 2021).

**Sortexempel:** 'Strubbe's Orange'

### **Zea mays Saccharata-Gruppen**

#### **sockermajs**

Aldén & al. 2009. Namn baserat på *Zea mays* var. *saccharata* (Sturtev.) L. H. Bailey. Gruppen innefattar alla sorter vi till vardags kallar majs, med en rad olika användningsområden som livsmedel.

**Sortexempel:** 'Honey Sweet'

## Referenser till Gruppnamnen för nyttoväxter

- Aldén, B., Ryman, S. & Hjertson, M. 2009  
*Våra kulturväxters namn, ursprung och användning*. Formas Förlag, Stockholm.
- Aldén, B. & Ryman, S. 2022  
*Svensk sortklassificering av odlade växter. Prydnadsväxterna och deras Grupper*. Stad & Land 191, Alnarp.
- Andres, T. C. 1995  
*Complexities of the infraspecific nomenclature of the Cucurbita pepo complex*.  
*Acta Horticulturae* 413: 65-91.
- Bailey, L. H. 1900-1902  
*Cyclopedia of American horticulture. Vol. 1-4*. Macmillan, New York.
- Barlow, S. & Porcher, M. 2005  
*Multilingual Multiscript Plant Name Database – sorting Beta names* Online. The University of Melbourne, Melbourne  
Online-database on <https://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Beta.html>.
- Barroso, J. M. 2014  
*Kommissionens förordning (EU) nr 752/2014 av den 24 juni 2014 om ersättning av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005*. Europeiska unionen officiella tidning L 208, femtiosjunde årgången.
- Bergianska trädgården 1937  
*Priskurant från Bergianska trädgården*. Bergianska trädgården, Stockholm.
- Brickell, C.D. & al. (ed.) 2016  
*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (Scripta Horticulturae 10)*. ISHS, Leuven, Belgium.
- Candolle, A. P. de 1828  
*Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis. Pars tertia*. Treuttel et Würtz, Paris.
- Dahl, C. G. 1943  
*Pomologi Del II Päron och Plommon*. Albert Bonniers Förlag, Stockholm.
- Dahlmark, N. 1926  
*Vårt hems trädgårdsbok*. Åhlén & Holm, Stockholm.
- Dahlberg, G. & Johansson, I. 1941  
*Svenskt Lantbrukslexikon*. Esselte, Stockholm.
- Engstrand, L. & Widén, M. 2002  
*Fruktar från främmande länder*. Formas, Stockholm.
- Engstrand, L. & Widén, M. 2017  
*Kryddor och kryddväxter från hela världen*. Bokförlaget Arena, Malmö
- Eriksen, B. & al. 2013  
*Nyttoväxter från hela världen*. Warne Förlag, Sävedalen.
- Facciola, S. 1998  
*Cornucopia II. A Source Book of Edible Plants*. Kampong Publications, Vista.
- Gréen, S. 1984  
*Det Bästas Stora Trädgårdsllexikon*. Reader's Digest AB, Stockholm.
- GRIN 2021  
*Taxonomy for Plants*. National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. Online-database on <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/search>.
- Guzman, C. C. de & Siemonsma, J. S. 1999  
*Plant Resources of South-East Asia (PROSEA) - No. 13: Spices*. Backhuys Publishers, Leiden.
- Hanelt, P. et al. 2001  
*Mansfeld's Encyclopedia of Agricultural and Horticultural crops*. Springer Verlag, Heidelberg.
- Holzhausen, A. 1938  
*Svenskt Trädgårdsllexikon*. Albert Bonniers Förlag, Stockholm.
- Hylander, N. 1953  
*Nordisk Kärnväxtflora I*. Almqvist & Wiksell, Stockholm.
- Impecta Fröhandel 2022  
*Frökatalog 2022*. Impecta Fröhandel, Julita
- Israelsson, L. 2000  
*Handbok för köksträdgården*. Wahlström & Widstrand, Stockholm.
- Jalapeno.nu 2022  
*Hot and exotic seeds*. På <https://jalapeno.nu/>. Hämtat 2022-01-21
- Jordbruksverket 2020  
*Sortlista 2020. National List of Plant Varieties 2020*. Pdf, nedladdad 2021.
- Jönsson, B. & Simmons, H. G. 1935  
*Gagnväxter*. Gleerup, Lund.
- Kostermans, A. J. G. H. 1966  
*A Monograph of Aglaia, Sect. Lansium Kosterm. (Meliaceae)*.  
*Reinwardtia* 7: 221-282.



- Krok, T. O. B. N. & Almquist, S. 1883  
*Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer. Z.*  
Häggströms Förlagsexpedition,  
Stockholm.
- Lange, W. & al. 1999  
*Taxonomy and cultonomy of beet (Beta vulgaris L.)*. Bot. J. Linn. Soc. 130: 81-96.
- Larsson-Kilian, A. 1912  
*Småbruket*. J. A. Lindblads Förlag,  
Uppsala
- Lim T. K. 2012  
*Cucumis melo (Makuwa Group)*. In: *Edible Medicinal And Non-Medicinal Plants*.  
Springer, Dordrecht.
- Lindblom, L. 2016  
*Lindbloms Frö. Katalog 2016*. Lindbloms  
Frö, Kivik.
- Linné, C. von 1731  
*Adonis uplandicus sive Hortus uplandicus*.  
P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm.
- Linell, T. & Hylander, N. T. 1955  
*Nyttoväxter i färg*. Almqvist & Wiksell,  
Stockholm.
- Lord, T. 2007  
*RHS Plant Finder 2007-2008*. Dorling  
Kindersley, London.
- Lundén, O. 1912  
*Köksväxtodling*. Förlagsaktiebolaget  
Otava, Helsingfors.
- Mabberley, D. J. 2017  
*Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses*. Cambridge University Press,  
Cambridge.
- Makino, T. 1952  
*Makino's new illustrated flora of Japan*  
Tokyo.
- Molteberg, B. & Aamlid, S. A. 2007  
*Nordisk sortguide för gräs till grönytor, 2007*. Bioforsk FOKUS: 2 (18), 125 s.
- Nathorst, A. G. 1905  
*Svenska växtnamn*. P. A. Norstedt &  
Söners Förlag, Stockholm.
- Noisette, L. C. 1825  
*Manuel Complet du Jardinier, Tome Deuxième*. Rousselon, Libraire-Éditeur,  
Paris.
- Osvald, H. 1959  
*Åkerns nyttoväxter*. AB Svensk Litteratur,  
Stockholm.
- Osvald, H. 1965  
*Potatisen. Odlingshistoria och användning*. Natur och Kultur, Stockholm.
- Porcher, M. H. 2007  
*Multilingual Multiscript Plant Name Database – Sorting Pisum names*. The University of Melbourne. Online database on M.M.P.N.D. – Sorting Pisum names (unimelb.edu.au)
- Siemonsma, J. S. & Piluek, K. 1993  
*Plant Resources of South-East Asia (PROSEA) - No. 8: Vegetables*. Pudoc Scientific Publishers, Wageningen.
- Purseglove, J. W. & al. 1981  
*Spices 2 vols*. Longman Scientific & Technical, Harlow, Essex & New York
- Ramsay, G. & Bryan, G. 2011  
*Chapter 12: Solanum*. In Kole, C. (ed.) 2011: *Wild Crop Relatives: Genomic and Breeding Resources, Vegetables*. Springer.
- Räty, E. 2017  
*Viljelykasvien nimistö (Kulturväxternas namn)*. Trädgårdsförbundet, Helsinki.
- Stace, C. A. 2019  
*New Flora of the British Isles*. C & M Floristics, Middlewood Green.
- Statens Växsortnämnd 1995  
*Sortlista 1995*. Meddelande från Statens Växsortnämnd, Statens Växsortnämnd, Solna.
- Svensson, P. 1893  
*Flora över Sveriges kulturväxter*. Norstedt, Stockholm.
- Säll, C. 2005  
*Svenska namn på plantskoleväxter, del VI. Viola – Trädgårdsvärlden 52*.
- Truedsson, Å. 1999  
*Minikiwi på frammarsch*. Hemträdgården 54 (3): 8-9.
- Verheij, E. W. H. & Coronel, R. E. 1991  
*Plant Resources of South-East Asia (PROSEA) No. 2. Edible fruits and nuts*. Pudoc, Wageningen.
- Wiersema, J. & León, B. 2013  
*World Economic Plants*. CRC Press, Boca Raton, Florida.
- WCSP 2021  
*World Checklist of Selected Plant Families*. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Online-database on <http://wcsp.science.kew.org>, hämtat 2022-01-22

## Register till svenska och engelska namn på Grupper

Common names for Groups in Swedish and English, including some synonyms

|                                                  |    |                                          |    |
|--------------------------------------------------|----|------------------------------------------|----|
| <i>acorn pumpkin</i> se ollonpumpa               |    | <i>blodgrape</i> se grapefrukt           |    |
| adriaafikon                                      | 24 | blomsellerikål                           | 13 |
| <i>annual turnip rape</i> se vårrybs             |    | <i>borecole</i> se grönkål               |    |
| apelsin                                          | 18 | <i>bottle gourd</i> se pilgrimsflaska    |    |
| apelsinpumpa                                     | 22 | (och <i>Lagenaria siceraria</i> )        |    |
| <i>asparagus bean</i> se långböna                |    | bourbonkaffe                             | 19 |
| <i>asparagus lettuce</i> se sparrissallat        |    | <i>boysenbär</i> se björnbärshallon      |    |
| <i>baby broccoli</i> se daggbroccoli             |    | <i>broccoflower</i> se broccolo          |    |
| banan                                            | 28 | broccoli                                 | 12 |
| <i>bataviasallat</i> se huvudsallat              |    | <i>broccoloni</i> se daggbroccoli        |    |
| <i>beetroot</i> se rödbeta                       |    | broccolirybs                             | 16 |
| <i>Belgian endive</i> se cikoriasallat           |    | broccolo                                 | 11 |
| <i>bell pepper</i> se paprika                    |    | bronsfänkål                              | 24 |
| bergamott                                        | 18 | <i>broom corn</i> se kvastdurra          |    |
| bergris                                          | 29 | <i>brun böna</i> se kokböna              |    |
| <i>biennial turnip rape</i> se höstrybs          |    | <i>Brussels sprouts</i> se brysselkål    |    |
| bindsallat                                       | 26 | brysselkål                               | 12 |
| <i>bitter orange</i> se pomerans                 |    | brytböna                                 | 29 |
| björnbärshallon                                  | 34 | brytmärgärt                              | 30 |
| <i>black oat</i> (partly) se svarthavre          |    | brytsockerärt                            | 30 |
| (och <i>Avena strigosa</i> )                     |    | <i>bush bean</i> se brytböna, kokböna,   |    |
| <i>black radish</i> se rättika                   |    | skärböna och vaxböna                     |    |
| <i>blackberry (garden-)</i> se trädgårdsbjörnbär |    | <i>buskböna</i> se brytböna, kokböna,    |    |
| bladbroccoli                                     | 11 | skärböna och vaxböna                     |    |
| <i>bladcikoria</i> se rosensallat och            |    | <i>buskkål</i> se grenkål                |    |
| sallatscikoria                                   |    | <i>butterhead lettuce</i> se huvudsallat |    |
| bladpersilja                                     | 29 | <i>cabbage</i> se white cabbage,         |    |
| bladsarepta                                      | 10 | red cabbage etc.                         |    |
| bladselleri                                      | 7  | <i>cabbage turnip</i> se kålrabbi        |    |
| <i>bladselleri</i> (fel använt) se blekselleri   |    | <i>caisin</i> se blomsellerikål          |    |
| blekselleri                                      | 6  | <i>calabrese</i> se vinterbroccoli       |    |

|                                                                                         |    |                                                        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|----|
| cantaloupemelon                                                                         | 19 | <i>curled lettuce</i> se plocksallat                   |    |
| <i>cardoon</i> se kardon                                                                |    | <i>curled-leaved endive</i> se friséesallat            |    |
| cassabamelon                                                                            | 20 | <i>curly kale</i> se grönkål                           |    |
| <i>Catalogna chicory</i> se sallatscikoria                                              |    | <i>cylinderkurbits</i> se cylinderpumpa                |    |
| <i>catjang</i> se katjangböna                                                           |    | cylinderpumpa                                          | 25 |
| <i>cauliflower</i> se blomkål                                                           |    | daggbroccoli                                           | 10 |
| <i>celery cabbage</i> se salladskål                                                     |    | daggkål                                                | 9  |
| <i>chard</i> se mangold                                                                 |    | daikon                                                 | 30 |
| <i>charentaismelon</i> se cantaloupemelon                                               |    | delicata-pumpa                                         | 20 |
| <i>cherry pepper</i> se körsbärspaprika                                                 |    | <i>dent corn</i> se fodermajs                          |    |
| <i>chili</i> se chilipeppar                                                             |    | <i>dessertbanan</i> se banan                           |    |
| chilipeppar                                                                             | 16 | <i>donut nectarine</i> se saturnusnektarin             |    |
| <i>Chinese cabbage</i> se salladskål                                                    |    | <i>drivcikoria</i> se cikoriasallat                    |    |
| <i>Chinese celery mustard</i> se sellerikål                                             |    | druvgurka                                              | 20 |
| <i>Chinese kale</i> se daggkål                                                          |    | <i>dry pea</i> se kokärt                               |    |
| <i>Chinese mustard</i> se bladsarepta                                                   |    | <i>dry rice</i> se bergris                             |    |
| chinotto                                                                                | 17 | <i>dudaim melon</i> se mangomelon                      |    |
| <i>chop suey greens</i> se sallatskranskrage                                            |    | duku                                                   | 27 |
| <i>choy sum</i> se blomsellerikål                                                       |    | duku-langsat                                           | 27 |
| cikoriasallat                                                                           | 17 | durumvete                                              | 36 |
| citrusmynta                                                                             | 28 | <i>durum wheat</i> se durumvete                        |    |
| <i>climbing bean</i> se klättrande sorter av<br>brytböna, kokböna, skärböna och vaxböna |    | <i>eau de cologne mint</i> se citrusmynta              |    |
| <i>club wheat</i> se kubbvete                                                           |    | emmervete                                              | 36 |
| <i>cocozelle</i> se squash                                                              |    | <i>emmer wheat</i> se emmervete                        |    |
| <i>cooking banana</i> se kokbanan                                                       |    | <i>endive</i> se friséesallat och escarolesallat       |    |
| <i>collards</i> se foderkål och (delvis) grönkål                                        |    | <i>endivsallat</i> se cikoriasallat                    |    |
| <i>cone pepper</i> se prydnadschili                                                     |    | escarolesallat                                         | 17 |
| <i>cos lettuce</i> se bindsallat                                                        |    | fabrikspotatis                                         | 35 |
| <i>Creole potato</i> se inkapotatis                                                     |    | <i>fiberflax</i> se spånadslin                         |    |
| <i>crookneck squash</i> se skruvhalspumpa                                               |    | <i>field bean</i> se hästböna (och <i>Vicia faba</i> ) |    |
| <i>crown pea</i> se kronärt                                                             |    | <i>field pea</i> se kokböna (primärt)                  |    |
| <i>cucumber</i> se druvgurka och slanggurka                                             |    | <i>field pumpkin</i> se pajpumpa                       |    |
|                                                                                         |    | <i>flageoletböna</i> se kokböna                        |    |



|                                                       |    |                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|----|
| <i>flint corn</i> se flintmajs                        |    | grenkål                                               | 13 |
| flintmajs                                             | 38 | <i>gråärt</i> se foderärt                             |    |
| <i>Florence fennel</i> se sötfänkål                   |    | grön reine claudé                                     | 31 |
| <i>flour corn</i> se mjölmajs                         |    | grönkål                                               | 13 |
| <i>fodder beet</i> se foderbeta                       |    | <i>grönsaksmelon</i> se gurkmelon                     |    |
| <i>fodder kale</i> se foderkål                        |    | gul lök                                               | 7  |
| <i>fodder pea</i> se foderärt                         |    | <i>gulbeta</i> se rödbeta                             |    |
| <i>fodder radish</i> se oljerättika                   |    | gulhavre                                              | 9  |
| foderbeta                                             | 9  | gurkmelon                                             | 18 |
| foderkål                                              | 14 | <i>halfhigh bush blueberry</i> se hybridblåbär        |    |
| fodermajs                                             | 38 | <i>halloweenpumpa</i> se prydnadspumpa och            |    |
| fodermärgkål                                          | 13 | pajpumpa                                              |    |
| foderrajgräs                                          | 26 | <i>Hamburg parsley</i> se rotpersilja                 |    |
| foderraps                                             | 11 | <i>haricots verts</i> se brytböna                     |    |
| <i>foderrova</i> se rova                              |    | hasselnöt                                             | 17 |
| fodersockerbeta                                       | 9  | <i>hazel nut</i> se hasselnöt                         |    |
| foderärt                                              | 30 | <i>head lettuce</i> se huvudsallat                    |    |
| <i>four-rowed barley</i> se sexradskorn               |    | herkulesklubba                                        | 24 |
| fransk dragon                                         | 9  | <i>hokkaidopumpa</i> se hubbardpumpa                  |    |
| <i>French artichoke</i> se kronärtskocka              |    | och kabochapumpa                                      |    |
| <i>French bean</i> se brytböna, skärböna (i huvudsak) |    | <i>honeydew melon</i> se honungsmelon                 |    |
| <i>French tarragon</i> se fransk dragon               |    | honungsmelon                                          | 20 |
| friséesallat                                          | 17 | <i>horse bean</i> se hästböna                         |    |
| färskpotatis                                          | 35 | hubbardpumpa                                          | 21 |
| <i>garden pea</i> se spritärt                         |    | <i>huvudkål</i> se rödkål, savojkål, spetskål, vitkål |    |
| <i>gherkin</i> se druvgurka (i huvudsak)              |    | huvudsallat                                           | 26 |
| <i>globe artichoke</i> se kronärtskocka               |    | hybridblåbär                                          | 37 |
| <i>glutinous rice</i> se klibbris                     |    | hästböna                                              | 37 |
| <i>gooseberry</i> se krusbär                          |    | hävertkurbits                                         | 26 |
| grapefrukt                                            | 17 | hösthallon                                            | 34 |
| <i>greengage</i> se grön reine claudé                 |    | <i>hösthavre</i> se vithavre                          |    |
| greenrödsvingel                                       | 24 | <i>höstkorn</i> se tvåradskorn och sexradskorn        |    |
|                                                       |    | höstraps                                              | 11 |

|                                               |    |                                         |    |
|-----------------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|
| höstrybs                                      | 14 | koreansk melon                          | 20 |
| höstvete                                      | 36 | kronärt                                 | 31 |
| <i>iceburg lettuce</i> se huvudsallat         |    | kronärtskocka                           | 23 |
| indicaris                                     | 28 | <i>krusbär</i> se trädgårdskrusbär      |    |
| indisk dill                                   | 8  | krusvinbär                              | 33 |
| indisk rybs                                   | 16 | kruthornspumpa                          | 27 |
| inkapotatis                                   | 34 | kryddfänkål                             | 24 |
| <i>isbergssallat</i> se plocksallat           |    | kryprosmarin                            | 33 |
| <i>Jersey kale</i> se palmkål                 |    | kubbvete                                | 35 |
| <i>jätterättika</i> se daikon                 |    | kurrat                                  | 7  |
| <i>industricikoria</i> se rotcikoria          |    | kvastdurra                              | 35 |
| <i>Italian parsley</i> se bladpersilja        |    | kålrabbi                                | 12 |
| <i>Italian tangerine</i> se medelhavsmandarin |    | kålrot                                  | 11 |
| <i>Japanese cantaloupe</i> se koreansk melon  |    | körsbärspaprika                         | 16 |
| <i>Japanese mustard spinach</i> se komatsuna  |    | labruskavin                             | 37 |
| <i>japansk rättika</i> se daikon              |    | langsat                                 | 27 |
| japonicaris                                   | 29 | <i>leaf broccoli</i> se bladbroccoli    |    |
| <i>jostabär</i> se krusvinbär                 |    | <i>leaf chicory</i> se sallatscioria    |    |
| kabochapumpa                                  | 21 | <i>leaf lettuce</i> se plocksallat      |    |
| <i>kai lan</i> se daggkål                     |    | <i>leek</i> se purjolök                 |    |
| <i>kale</i> se grönkål                        |    | limett                                  | 18 |
| kardon                                        | 23 | <i>lo bok</i> se kinesisk rättika       |    |
| katjangböna                                   | 37 | <i>loganbär</i> se björnbärshallon      |    |
| khorasanvete                                  | 36 | långböna                                | 37 |
| <i>kidney bean</i> se kokböna                 |    | <i>majrova</i> se rova                  |    |
| kinesisk rättika                              | 32 | <i>majs</i> se sockermajs (vanligen)    |    |
| klementin                                     | 18 | mammutpumpa                             | 21 |
| klibbris                                      | 28 | mangold                                 | 9  |
| <i>kohlrabbi</i> se kålrabbi                  |    | mangomelon                              | 19 |
| kokbanan                                      | 28 | <i>marrowfat pea</i> se brytmärgärt     |    |
| kokböna                                       | 29 | och märgärt                             |    |
| kokärt                                        | 30 | <i>marrow-stem kale</i> se fodermärgkål |    |
| komatsuna                                     | 15 | medelhavsmandarin                       | 18 |

|                                                 |    |                                                                |    |
|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|----|
| <i>Mediterranean mandarin</i>                   |    | oval kumquat                                                   | 18 |
| se medelhavsmandarin                            |    | pajpumpa                                                       | 22 |
| <i>mibuna</i> se mizunakål                      |    | <i>pak choi</i> se sellerikål                                  |    |
| minikiwi                                        | 7  | palmkål                                                        | 13 |
| mizunakål                                       | 14 | paprika                                                        | 16 |
| mjölmajs                                        | 38 | parkrajgräs                                                    | 28 |
| <i>mountain rice</i> se bergris                 |    | <i>patisson</i> se tefatspumpa                                 |    |
| <i>musk melon</i> se nätmelon                   |    | <i>pe-tsai</i> se sellerikål                                   |    |
| <i>musselsquash</i> se tefatspumpa              |    | <i>pickled onion</i> se syltlök                                |    |
| myrobalanplommon                                | 31 | <i>pie pumpkin</i> se pajpumpa                                 |    |
| <i>märgpumpa</i> se squash                      |    | pilgrimsflaska                                                 | 26 |
| <i>märgsockerärt</i> se sockerärt               |    | <i>plain-leaved endive</i> se escarolesallat                   |    |
| märgärt                                         | 30 | <i>plantain (partly)</i> se kokbanan                           |    |
| nakenfröppumpa                                  | 23 | plattkurbits                                                   | 26 |
| <i>naked barley</i> se nakenkorn                |    | plocksallat                                                    | 26 |
| nakenkorn                                       | 25 | <i>pointed cabbage</i> se spetskål                             |    |
| nätmelon                                        | 20 | <i>pole bean</i> se brytböna, kokböna,<br>skärböna och vaxböna |    |
| <i>oat</i> se gulhavre, svarthavre och vithavre |    | <i>polkabeta</i> se rödbeta                                    |    |
| <i>olalliebär</i> se björnbärshallon            |    | <i>Polish wheat</i> se polskt vete                             |    |
| <i>oil flax</i> se oljelin                      |    | polskt vete                                                    | 36 |
| oljelin                                         | 27 | pomerans                                                       | 17 |
| <i>oil radish</i> se oljerättika                |    | <i>pop corn</i> se popmajs                                     |    |
| oljerättika                                     | 32 | popmajs                                                        | 38 |
| ollonpumpa                                      | 21 | portugisisk kål                                                | 12 |
| <i>onion</i> se gul lök                         |    | <i>potatislök</i> se schalottenlök                             |    |
| <i>orange</i> se apelsin                        |    | <i>potato onion</i> se schalottenlök                           |    |
| <i>orange gourd</i> se apelsinpumpa             |    | prydnadschili                                                  | 16 |
| <i>Oriental pickling melon</i>                  |    | prydnadskål                                                    | 13 |
| se orientalisk melon                            |    | prydnadsmajs                                                   | 38 |
| orientalisk melon                               | 19 | prydnadspumpa                                                  | 22 |
| ormlök                                          | 8  | <i>puffmajs</i> se popmajs                                     |    |
| ormrättika                                      | 32 | purjolök                                                       | 7  |
| <i>ornamental gourd</i> se prydnadspumpa        |    |                                                                |    |



|                                                |    |                                             |    |
|------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|
| purpursellerikål                               | 15 | <i>Russian tarragon</i> se rysk dragon      |    |
| <i>purple-stem mustard</i>                     |    | <i>rutabaga</i> se kålrot                   |    |
| se purpursellerikål                            |    | <i>rybs</i> se vårrybs och höstrybs         |    |
| <i>pearl onion</i> se pärlök                   |    | rysk dragon                                 | 9  |
| <i>pärlböna</i> se brytböna                    |    | rysslärk                                    | 27 |
| pärlök                                         | 7  | rädisa                                      | 32 |
| <i>Queen Anne's pocket melon</i>               |    | rättika                                     | 32 |
| se mangomelon                                  |    | <i>röd kidneyböna</i> se kokböna            |    |
| <i>raddichio</i> se rosensallat                |    | röda vinbär                                 | 33 |
| <i>radish</i> se rädisa                        |    | rödbeta                                     | 9  |
| <i>rapini</i> se broccolirybs                  |    | rödkål                                      | 13 |
| <i>raspberry, (garden-)</i> se trädgårdshallon |    | rödlök                                      | 8  |
| <i>red beet</i> se rödbeta                     |    | salladskål                                  | 15 |
| <i>red cabbage</i> se rödkål                   |    | sallatscikoria                              | 17 |
| <i>red currant</i> se röda vinbär              |    | sallatskranskrage                           | 24 |
| <i>red onion</i> se rödlök                     |    | sanpedrofikon                               | 24 |
| <i>rhubarb chard</i> se mangold                |    | satsuma                                     | 19 |
| <i>rocambole</i> se ormlök                     |    | <i>saturn nectarine</i> se saturnusnektarin |    |
| <i>romanesco</i> se broccolo                   |    | saturnusnektarin                            | 32 |
| <i>Roman fennel</i> se kryddfänkål             |    | savojkål                                    | 13 |
| <i>romansallat</i> se bindsallat               |    | <i>Savoy cabbage</i> se savojkål            |    |
| <i>root chicory</i> se rotcikoria              |    | schalottenlök                               | 7  |
| rosensallat                                    | 17 | sellerikål                                  | 14 |
| <i>rosette pak shoi</i> se tatsoikål           |    | <i>serpent garlic</i> se ormlök             |    |
| <i>rosettkål</i> se tatsoikål                  |    | <i>Seville orange</i> se pomerans           |    |
| rotcikoria                                     | 17 | sexradskorn                                 | 25 |
| rotpersilja                                    | 29 | <i>shallot</i> se schallotenlök             |    |
| rotselleri                                     | 8  | <i>shun giku</i> se sallatskranskrage       |    |
| <i>round pea</i> se spritärt                   |    | <i>Siberian kale</i> se sibirisk bladrap    |    |
| rova                                           | 16 | sibirisk bladrap                            | 11 |
| ruffrödsvingel                                 | 24 | silverlök                                   | 8  |
| <i>Russian kale</i> se sibirisk bladrap        |    | <i>silverskin onion</i> se silverlök        |    |
| <i>Russian lark</i> se rysslärk                |    | <i>six-rowed barley</i> se sexradskorn      |    |

|                                             |    |                                         |    |
|---------------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|
| skruvhalspumpa                              | 22 | <i>stensärt</i> se mägärt               |    |
| skyffelkorn                                 | 25 | <i>straightneck squash</i> se smörpumpa |    |
| skärböna                                    | 29 | <i>string bean</i> se brytböna och      |    |
| slanggurka                                  | 20 | (delvis) skärböna                       |    |
| smyrnafikon                                 | 24 | <i>Styrian hulless pumpkin</i> se       |    |
| smörpumpa                                   | 23 | nakenfröpumpa                           |    |
| <i>snake bean</i> se långböna               |    | <i>störböna</i> se brytböna, kokböna,   |    |
| <i>snap bean</i> se brytböna                |    | skärböna och vaxböna                    |    |
| <i>snake melon</i> se gurkmelon             |    | <i>sugar beet</i> se sockerbeta         |    |
| <i>snow pea</i> se sockerärt                |    | <i>sugar pea</i> se sockerärt           |    |
| sockerbeta                                  | 10 | <i>sugar snap pea</i> se brytsockerärt  |    |
| sockerdurra                                 | 35 | <i>summer rape</i> se vårraps           |    |
| sockermajs                                  | 38 | <i>summer oat</i> se vithavre           |    |
| sockerärt                                   | 31 | <i>summer wheat</i> se vårvete          |    |
| <i>sommarpotatis</i> se färskpotatis        |    | <i>svart böna</i> se kokböna            |    |
| <i>sommarpumpa</i> se främst squash,        |    | svarthavre                              | 9  |
| tefatspumpa, skruvhalspumpa,                |    | <i>svartkål</i> se palmkål              |    |
| smörpumpa, spagettipumpa                    |    | <i>sweet fennel</i> se kryddfänkål      |    |
| <i>sour orange</i> se pomerans              |    | <i>sweet pea</i> se spritärt            |    |
| spagettipumpa                               | 23 | <i>sweet pepper</i> se paprika          |    |
| <i>spaghetti squash</i> se spagettipumpa    |    | <i>sweet sorghum</i> se sockerdurra     |    |
| sparrissallat                               | 25 | <i>sweet yellow bean</i> se vaxböna     |    |
| speltvete                                   | 36 | <i>swede rape</i> se höstraps           |    |
| <i>spelt wheat</i> se speltvete             |    | <i>swede</i> se kålrot                  |    |
| <i>spinach beet</i> se mangold              |    | <i>Swedish turnip</i> se kålrot         |    |
| <i>sprat barley</i> se skyffelkorn          |    | <i>Swiss chard</i> se mangold           |    |
| spritärt                                    | 31 | sytlök                                  | 8  |
| <i>sprouting broccoli</i> se vinterbroccoli |    | sötfänkål                               | 24 |
| <i>spräcklig böna</i> se kokböna            |    | tangelo                                 | 18 |
| spånadslin                                  | 27 | tangerin                                | 19 |
| squash                                      | 23 | tangor                                  | 17 |
| <i>stalk celery</i> se blekselleri          |    | tatsoikål                               | 14 |
| <i>stjälkselleri</i> se blekselleri         |    | <i>taybär</i> se björnbärshallon        |    |

|                                                                                               |    |                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|
| <i>tenderstem broccoli</i> se daggbroccoli                                                    |    | och sexradskorn                         |    |
| tefatspumpa                                                                                   | 22 | våraps                                  | 10 |
| <i>tick bean</i> se åkerböna                                                                  |    | vårrybs                                 | 14 |
| <i>tranchuda cabbage</i> se portugisisk kål                                                   |    | vårvete                                 | 36 |
| trädgårdsbjörnbär                                                                             | 33 | <i>wax bean</i> se vaxböna              |    |
| trädgårdshallon                                                                               | 34 | westerwoldiskt rajgräs                  | 28 |
| trädgårdskrusbär                                                                              | 33 | <i>Westerwold ryegrass</i> se           |    |
| turbanpumpa                                                                                   | 21 | westerwoldiskt rajgräs                  |    |
| <i>Turk's cap gourd</i> se turbanpumpa                                                        |    | <i>white cabbage</i> se vitkål          |    |
| <i>turnip</i> se rova                                                                         |    | <i>white cucumber</i> se vitgurka       |    |
| <i>turnip-rape</i> se rybs                                                                    |    | <i>white currant</i> se vita vinbär     |    |
| <i>turnip-rooted parsley</i> se rotpersilja                                                   |    | <i>willow-leaf mandarin</i> se          |    |
| tuvrödsvingel                                                                                 | 24 | medelhavsmandarin                       |    |
| tvåradskorn                                                                                   | 25 | <i>winter oat</i> se vithavre           |    |
| <i>two-rowed barley</i> se tvåradskorn                                                        |    | <i>winter rape</i> se höstraps          |    |
| typicakaffe                                                                                   | 19 | <i>winter wheat</i> se höstvet          |    |
| <i>typica coffee</i> se typicakaffe                                                           |    | <i>witloof</i> se cikoriasallat         |    |
| vaxböna                                                                                       | 29 | <i>witloof chicory</i> se cikoriasallat |    |
| viminalis-vide                                                                                | 34 | <i>wrinkled pea</i> se mägärt           |    |
| <i>viminalis willow</i> se viminalis-vide                                                     |    | <i>yellow sarson</i> se indisk rybs     |    |
| vinterbroccoli                                                                                | 14 | <i>youngbär</i> se björnbärshallon      |    |
| vinterpotatis                                                                                 | 35 | <i>zucchini</i> se squash               |    |
| <i>vinterpumpa</i> se hubbardpumpa,<br>mammutpumpa, pajpumpa,<br>turbanpumpa, ollonpumpa m fl |    | åkerböna                                |    |
| <i>vit böna</i> se kokböna                                                                    |    |                                         |    |
| vita vinbär                                                                                   | 33 |                                         |    |
| <i>vitbeta</i> se rödbeta                                                                     |    |                                         |    |
| vitgurka                                                                                      | 21 |                                         |    |
| vithavre                                                                                      | 9  |                                         |    |
| vitkål                                                                                        | 11 |                                         |    |
| <i>vårhavre</i> se vithavre                                                                   |    |                                         |    |
| <i>vårkorn</i> se tvåradskorn                                                                 |    |                                         |    |





# Svensk sortklassificering av odlade växter

## Nyttoväxterna och deras Grupper

Sedan Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD) blev tillgänglig på nätet 2005 har begreppet Grupp, tidigare benämnt sortgrupp, blivit en spridd och ofta använd facilitet i Sveriges plantskolor, i trädgårdslitteratur i odlarkretsar etc. Gruppen är ett praktiskt verktyg för att samla likartade sorter under ett tak, vilket gett oss möjlighet att ge övergripande information om de ingående sorterna och – vilket många efterlyst – även möjliggjort införandet av ett gemensamt svenskt namn på sådana sorter.

Sortklassificeringen som presenteras i denna bok är en fortsättning på sammanställningen om prydnadsväxternas Grupper (Stad & Land 191) och behandlar Grupper och deras namn inom våra jordbruksväxter, köksväxter, frukt och bär m. fl. Liksom den första delen motsvarar Grupperna här dem som fanns i SKUD 2021 och bygger både på internationell odlartradition och på den s.k. internationella kulturväxtkodens Grupp-begrepp.

Enligt kulturväxtkoden är Gruppen en formell kategori där ordet Grupp eller -Gruppen alltid skrivs med inledande versal. För att vara internationellt etablerade föreskriver koden vidare att Gruppnamn måste publiceras med en beskrivning eller med en hänvisning till en tidigare sådan.

I tillägg till att göra Grupperna och deras namn internationellt etablerade ger denna del – nyttoväxternas Grupper - liksom den första delen om våra prydnadsväxter, alla kulturväxtintresserade en översikt av och bakgrund till aktuella Grupper i Sverige.



Den här boken är utgiven i SLU Tankesmedjan Moviums bokserie Stad & Land med nummer 192.